

Abdomen lisse, luisant, avec des points épars piligères qui sont aussi visibles sur la tête.

Pilosité un peu plus abondante et d'un jaune un peu plus foncé que chez le *Chobauti*. La pubescence espacée est aussi plus distincte sur la tête, avec direction transversale. Les cils de l'épistome sont plus courts.

D'un rouge sombre, beaucoup plus foncé que chez le *Chobauti*. Abdomen noirâtre. Pattes et antennes d'un jaune brun, avec les cuisses et les scapes brunâtres.

Hamâda, entre Mellalah et Houderat (Lameere).

Une ♀ porte encore une graine dans ses mandibules, preuve de ses mœurs moissonneuses.

Cette espèce fait la transition entre la forme ordinaire de la tête et la concavité subplane à bord barbu du *Chobauti* et du *Messor caviceps*.

12. **Holcomyrmex Faf** n. sp. — ♀. — Long. 12 mill. — Mandibules fortement striées, ponctuées, tridentées, à bord externe à peine convexe, à bord terminal très oblique, avec la dent apicale très longue, de sorte qu'elles sont à peine un peu triangulaires (bord interne presque parallèle au bord externe). Épistome tronqué devant, mais la surface tronquée est étirée dans le sens transversal et très courte dans le sens antéro-postérieur, se continuant de côté au delà des deux carènes longitudinales qui ne sont pas prolongées en dents, ciliée plutôt vers son bord supérieur d'une rangée de longs cils roux clair. La tête forme un rectangle transversal, bien plus large que long, à bord postérieur à peine concave. Sillon frontal entre deux faibles arêtes, indistinctement séparé de l'aire frontale. Articles 3 à 6 du funicule au moins aussi larges, sinon plus larges que longs. Les scapes atteignent le bord occipital. Thorax à peine aussi large que la tête; mésonotum avec deux sillons longitudinaux derrière. Scutellum avec une forte impression médiane devant. Métanotum entièrement arrondi et inerme, très faiblement imprimé en long au milieu. Premier nœud du pédicule comme chez le *Lameerei*, mais avec une dent dessous, devant. Second nœud un peu plus large que long.

La tête est atténuée dans le sens dorso-ventral, comme chez le *Chobauti*, avec sa face inférieure absolument aplatie, subbordée, subconcave, bordée entièrement d'une rangée de longs poils de barbe grossiers, courbés, d'un roux clair, disposés comme chez le *Chobauti*, mais ceux du bord postérieur sont beaucoup plus courts; ce sont les latéraux qui sont les plus longs.

Tête entièrement, fortement et densément striée en long, avec des points espacés, subopaque. Thorax en partie finement et densé-