

ment strié (stries arquées devant le mésonotum), en partie lisse et luisant en dessus, avec des points espacés. Pédicule et abdomen assez luisants, finement chagrinés, avec des points piligères.

Pilosité dressée, jaunâtre, plutôt clairsemée derrière, plus abondante sur le devant du corps. Pattes et scapes avec une pubescence oblique.

Noir. Mandibules, funicules, tarses, articulations des membres et bord des segments abdominaux roussâtres, les derniers plutôt d'un roux jaunâtre.

♂. — Long. 5,8 à 6 mill. — Mandibules tridentées. Derrière les yeux, qui sont fort gros, la tête a la forme d'un trapèze (rétréci en arrière). Du reste elle est aplatie et subconcaue dessous, ciliée ou barbue comme chez la ♀. Épistome bossu, tronqué et cilié devant. Scape à peine long comme les deux premiers articles du funicule. Thorax comme chez la ♀, mais l'impression du scutellum est faible. Premier nœud du pédicule plus arrondi en dessus, avec une dent ou épine longue et pointue devant, en dessous. Sculpture absolument comme chez la ♀. Pilosité plus longue et plus grossière.

Noir, avec les poils roussâtres, le bord des mandibules, les tarses et l'extrémité des funicules d'un roux brunâtre.

Les ailes subhyalines, à nervures et tache pâles, ont une cellule discoïdale, une cellule cubitale et une cellule radiale ouverte.

Ce ♂ et cette ♀ ont été trouvés en Algérie, probablement à Biskra, accouplés, par mon cousin, M. le professeur F.-A. Forel, en mars ou avril 1888.

Sont-ce peut-être les sexes ailés de l'une des deux espèces précédentes, malgré la taille et la couleur si disparates? La forme de la tête irait au *Chobauti* et la sculpture pourrait se rapporter au *Lameerei*. Il me semble plus probable qu'il s'agit d'une troisième espèce, dont l'ouvrière reste à découvrir.

13. *MONOMORIUM GRACILLIMUM* Smith. — ♀. — Biskra (Lameere). Il est fort intéressant de retrouver en Algérie cette espèce de Palestine, de Syrie et d'Arabie.

14. *MONOMORIUM SALOMONIS* L. — ♀, ♂. — Biskra; Col de Sfa; Sidi-Yaya; Tougourt; Maouiet-al-Caïd; Bou-Harmès; Blidet-Amar à Tillis; Tillis à Mela; Hamâda, entre Mellalah et Houderat; Oued Mزاب; Settafa à Laghouat; Laghouat; Aïn Smara à Bou-Saada (Lameere).

Cette fourmi, la plus commune de l'Atlas, s'étend donc dans le désert, aussi loin que M. Lameere a été.

15. *Solenopsis* Lou n. sp. — ♀. — Long. 5 à 5,3 mill. — Mandibules lisses avec quelques points et quatre dents. Tête plus longue