

16. *PHEIDOLE PALLIDULA* Nyl. — ♂, ♀, ♂. — Biskra, Col de Sfa, El Oued, Bou-Harmès, Blidet-Amar, entre Mela et Dra-Alkesdir, Ouargla, Ghardaïa, Settafa à Laghouat, Laghouat (4 juin) (Lameere); Hammam Salahin près Biskra, Tougourt (Diehl).

Cette espèce qui, dans le sud de l'Europe, va au nord jusqu'aux Alpes (Tessin, Suisse), s'étend donc dans le Sahara aussi loin que M. Lameere a été.

17. *CREMASTOGASTER SCUTELLARIS* Oliv. — ♂. — Aïn Smara à Bou-Saada (Lameere) Commun dans l'Atlas.

18. *CREMASTOGASTER SCUTELLARIS* Ol. r. ***tenuispina*** n. st. — ♂. — Long. 3,7 à 4,2 mill. — Entièrement d'un rouge jaunâtre plus clair, mais moins vif, plus terne que chez la forme typique. Abdomen brun. Les épines du métanotum sont un peu plus longues que chez le *scutellaris* typique, mais surtout beaucoup plus ténues, plus grêles, à peine plus épaisses à la base qu'à l'extrémité. La sculpture du thorax est aussi bien plus faible et plus fine, et la pubescence presque nulle sur l'abdomen, et bien plus fine et plus appliquée sur la tête et les membres. Tout l'insecte est un peu plus grêle et ne ressemble nullement à l'*Auberti*.

Messaad (Lameere). Cette race, qui paraît locale, a lieu d'étonner, si l'on songe à la constance du *C. scutellaris* dans son grand domaine.

19. *CREMASTOGASTER INERMIS* Mayr. — ♂. — Tougourt, entre Mela et Dra-Alkesdir, Settafa à Laghouat, une variété près de la var. *lucida* Forel à Biskra (Lameere). Espèce saharienne.

20. *CREMASTOGASTER AUBERTI*. Emery. — ♂. — Aïn Smara à Bou-Saada (Lameere). Forme de l'Atlas.

21. *CREMASTOGASTER AUBERTI* r. *LÆSTRYCON* Emery. — ♂. — Saint-Charles, près Philippeville, Messaad à Aïn-Smara, Aïn-Smara à Bou-Saada (Lameere). Forme typique de l'Atlas.

Var. *sordida* Forel. — ♂. — Biskra (Lameere).

4° sous-famille. — DOLICHODERINÆ For.

22. *TAPINOMA ERRATICUM* Latr. r. *NIGERRIMUM* Nyl. — ♂, ♀, ♂. — Biskra, Tougourt, Oued Mzab, Laghouat (Lameere). Avril-mai.

Var. *erratico-nigerrimum* For. — ♂. — De Settafa à Laghouat, Laghouat, de Laghouat à Messaad, Aïn-Smara à Bou-Saada, Bou-Saada, Biskra (Lameere); celles des dernières localités presque *erraticum*.

Cette espèce, qui fourmille dans l'Atlas et dans le midi de l'Europe, va donc très avant dans le désert.