

## 5° sous-famille. — CAMPONOTINÆ For.

23. *PLAGIOLEPIS PYGMÆA* Latr. — ♀. — Saint-Charles, près Philippeville, Biskra (Lameere). Espèce de l'Europe méridionale et de l'Atlas.

Var. *pallescens* Forel. — ♀, ♂. — Col de Sfa, 16 avril 1898; Biskra (Lameere).

24. *ACANTHOLEPIS FRAUENFELDI* Mayr. — ♀. — Biskra, entre Mela et Dra-Alkesdir, Messaad à Aïn-Smara, Aïn-Smara à Bou-Saada (Lameere).

Var. *bipartita* Smith. — ♀, ♂. — Biskra, Tougourt, Temacin, Ouargla, Ghardaïa, les sexes ailés le 29 avril (Lameere); Tougourt (Diehl).

Espèce d'Orient et de l'Atlas; la var. *bipartita* est plus saharienne.

25. *FORMICA KRAUSSII* Forel. — ♀. — Ghardaïa, Berrian (Lameere).

♂. — Long. 3,5 mill. — Mandibules étroites, unidentées. Yeux énormes et convexes, moins grands cependant, proportions gardées, que chez *l'oculatissima*, à laquelle elle ressemble en petit. Ocelles très gros aussi. Tête convexe, arrondie derrière les yeux. Épistome avec une convexité longitudinale médiane. Les scapes dépassent l'occiput. Métanotum aplati, en plan incliné. Écaille très épaisse, nodiforme, basse, large, arrondie dessus. Abdomen court, élevé. Les segments sont séparés par de légers resserrements, comme chez les *Myrmecocystus*. Lame subgénitale entière. Les valvules génitales extérieures sont très longues, moitié coupées en biseau, moitié acuminées à l'extrémité, dirigées de haut en bas et dépassant de beaucoup les autres. Ailes assez courtes, hyalines, à reflets irisants, à tache et nervures pâles.

Très lisse et très luisant. Pilosité courte, éparse, jaunâtre, obtuse, comme chez l'ouvrière, mais plus fine.

Entièrement d'un brun de poix. Tarses, mandibules et scapes d'un jaune brunâtre.

Dra-Alkesdir, 16 mai 1898 (Lameere).

Quoique pris sans les ♀, ces ♂ sont, sans aucun doute, ceux de la *F. Kraussii*. Ils confirment l'analogie de cette espèce avec le genre *Myrmecocystus*.

Découverte par le Dr Krauss en 1893 à Oued-en-Nsa, entre Tougourt et Ouargla, cette singulière *Formica* saharienne vient donc d'être retrouvée par M. le Prof. Lameere, qui y ajoute le ♂ jusqu'ici inconnu. Ce ♂ a certaines analogies avec ma *F. oculatissima* de Grèce, dont l'ouvrière est toujours inconnue et qui pourrait être le ♂ inconnu de la *F. nasuta* Nyl. Mais *l'oculatissima* a les ailes plus