

longues que toutes les autres et les antennes très longues aussi, tandis que la *Kraussii* a les ailes et les antennes courtes.

26. *MYRMECOCYSTUS BOMBYCINUS* Roger. — ♂, ♀, ♀, ♂. — Biskra, 14 avril, Biskra, montagne de sable, entre Maouiet-Ferzan et Maouiet-al-Caïd, 7 mai, El Oued, entre Tillis et Mela, Oued Mzab, Ghardaïa (Lameere); Tougourt (Diehl).

27. *MYRMECOCYSTUS VIATICUS* F. r. *DESERTORUM* For. — ♂, ♂. — Biskra, Hammam Salabin, Sidi-Yaya, El Oued, entre Mela et Dra-Alkesdir, Ouargla, Ghardaïa, Settafa à Laghouat, Laghouat, 3 juin, entre Laghouat et Messaad, Messaad à Aïn-Smara, Bou-Saada (Lameere); Biskra (Diehl).

Cette race s'avance donc en plein dans le désert. Elle va cependant au nord jusque dans les steppes arides de l'arrière-Atlas où je l'ai prise moi-même, mais pas plus loin. Dans la partie cultivée de l'Atlas, l'*altisquamis* et le *megalocola* la remplacent.

Var. **Diehlii** n. var. — Plus petit que le type, presque entièrement noir et plus luisant. Nœud comme chez le type, et pas comme chez la race *niger* André, dont il n'a pas la pubescence. Biskra (Diehl).

28. *MYRMECOCYSTUS ALBICANS* Roger. — ♂. — Laghouat, Biskra, Sidi-Okba, Col de Sfa, Ghardaïa, Settafa à Laghouat, Laghouat, Messaad à Aïn-Smara, Bou-Saada (Lameere). Espèce de l'Atlas surtout.

Var. **fortis** n. var. — De 6 à 9 mill. de long. Pubescence blanche du métanotum très apparente et forte, visible aussi au pronotum.

Près de Tougourt, sur le chemin de Temacin (Diehl).

Dans l'Atlas, la forme typique n'atteint que de 3,5 à 7 millimètres. A Oued-Mela, près de Gabès (désert tunisien), j'ai trouvé des ♂ de 8 millimètres, se rapprochant de la var. *fortis*.

29. *MYRMECOCYSTUS ALBICANS* Roger r. *VIATICOIDES* André. — ♂. — Biskra, Hamâda, entre Mellalah et Houderat (Lameere); Tougourt (Diehl). Forme plus saharienne que la précédente.

30. *MYRMECOCYSTUS ALBICANS* Rog. r. *LIVIDUS* André. — ♂. — Biskra; Hamâda, entre Mellalah et Houderat (Lameere). Fort voisine de la race précédente, dont elle n'est guère qu'une variété.

31. **Myrmecocystus Lameerei** n. sp. — ♂. — Long. 3,3 à 6,8 mill. — Vrai mimétisme de l'*albicans* r. *viaticoides* André, dont il a la taille et la couleur, cette dernière cependant un peu plus pâle et un peu plus terne. Mais il en diffère comme suit.

La stature est plus ramassée; les pattes et les antennes sont plus courtes et un peu plus ténues; les scapes dépassent moins l'occiput;