

4. *C. CONSPICUUS* Smith. Jamaïque, Kingston. Dans les jardins, sous le bois, dans un nid de termites envahi par lui, etc. Craintif. Le *Camp. zonatus* Emery de Costa-Rica n'est, à mon avis, qu'une variété du *conspicuus* et ne se rattache nullement au groupe *Landolti-substitutus*.

5. *C. MACULATUS* F, r. *INDIANUS* Forel. San Antonio. Forêt.

6. *C. LANDOLTI* Forel. Don Diego, Dibulla, Santa Marta, Calabasso, Ouriheka, San Antonio. Vit dans les troncs d'arbres pourris, au plus profond de la forêt, dans l'ombre perpétuelle. Timide.

7. *C. SUBSTITUTUS* Emery. Barranquilla, Cienaga, Zig-Zag. Niche dans la terre et le sable de la steppe et des clairières. Timide. Rappelle le *dichrous* d'Algérie par ses mœurs.

8. *C. RUFIPES* F. Une ♂ isolée du Venezuela. Nids en carton décrits par v. Ihering.

9. *C. CORUSCUS* Sm. Isolé, se promenant assez lentement dans la forêt. Impossible de trouver le nid. Santa Marta, San Antonio, Naranjo, Venezuela, Rio-Frio.

10. *C. NOVOGRANADENSIS* Mayr. Naranjo, Don Diego, Burithaca. Isolé.

11. *C. PLANATUS* Roger, v. *CONTINENTIS* Forel (Bull. Soc. ent. Belg., 1901, p. 369). Santa Marta; Bonda. Isolé.

12. *C. PLANATUS*. Roger, r. *COLUMBICUS* Forel n. st. (Biol. Centr. Am.). Cette forme remarquable mérite de former une race ou sous-espèce. Dibulla.

13. *C. BREVIS* Forel n. sp. (Biol. Centr. Am.), Calabasso, Naranjo, Santa Marta, San Antonio. Niche dans les tiges creuses et sèches.

14. *C. LINDIGI* Mayr. Santa Marta, Cienaga, Barranquilla, San Antonio (savanne), Ouriheka, Porto Cabello. J'ai trouvé son nid dans le sable, semblable à celui du *C. lateralis* d'Europe. Court et chasse beaucoup.

15. *C. BRETTESEI* Forel n. sp. (Biol. Centr. Am.). Naranjo et Trinidad. Dans les cavités des tiges.

16. *C. ZOC* Forel. Ouriheka, Trinidad, Porto Cabello. Niche dans les tiges sèches.

17. *C. ANGULATUS* Mayr, r. *MUTICUS* Forel n. st. (Biol. Centr. Am). Naranjo. Isolé.