

seulement à la Martinique? Parfois (Santa Lucia), les nids étaient plutôt bouchés avec des débris végétaux unis par quelques fils. Il semble exister chez cette espèce un rudiment d'instinct cartonnier qui ne se manifeste que dans certaines circonstances ou chez certaines variétés qui ne se différencient d'une façon appréciable que par l'instinct. Je n'ai pas vu de nid en carton chez la var. *grenadensis*. Cette variété rouge de Grenade et de la Barbade n'est pas la *F. decora* Smith, qui est noire.

27. C. (DENDROMYRMEX) CHARTIFEX Smith. Naranjo (isolé).

28. C. PELLITUS Mayr. Cienaga, Santa Marta, Porto-Cabello, chemin de San Antonio, Ouriheka; Curaçao (M. Bugnion). Niche dans la terre ou dans le sable, dans les lieux plutôt découverts. Le nid s'ouvre par des trous à ras de terre. La plupart des exemplaires colombiens ont la tête et le thorax entièrement rouges, ou du moins la tête et le prothorax.

V. *æquinotus* n. var. — ♂. — Une ♀ moyenne, récoltée par M. le professeur Bugnion en Venezuela pendant notre voyage, se distingue des autres par son thorax également convexe d'avant en arrière, avec la face basale du métanotum aussi convexe que le pronotum, tandis que, chez la forme typique, la bosse du promésonotum contraste avec le profil rectiligne du métanotum. La couleur de cette variété est, comme chez le type, noire avec le devant de la tête rouge. La pilosité dressée, jaune, est plus abondante que chez le type.

29. C. USTUS Forel, v. *arhuacus* n. var. — ♂ min. — De même taille que le type de l'espèce, mais de couleur un peu plus terne. La tête est un peu plus étroite et plus allongée, le métanotum (face basale) un peu moins convexe et le bord supérieur de l'écaïlle plus obtus. Sur chaque segment abdominal une bande transversale brune, étroite et nuageuse.

San Antonio, Colombie (isolée). La forme typique est de Saint-Thomas.

30. C. *fugax* n. sp. — ♂ maj. — Long. 6,5 mill. — Voisin de *claviscapus* et d'*impropius*. Mandibules courtes, épaisses, assez brusquement courbées au milieu, armées de 6 à 7 dents, ayant au côté externe de leur base une impression moins profonde, mais plus large que celle du *claviscapus*. Elles sont subopaques et abondamment ponctuées. L'épistome, distinctement caréné, est un peu plus étroit devant que derrière et plus allongé que chez le *claviscapus* (plus large devant que derrière, et sans carène chez le *claviscapus*); il n'a pas d'impression médiane derrière. La tête de la ♀ maxima est distinctement plus large derrière que devant (aussi large devant