

que derrière chez le *claviscapus*). Les arêtes frontales, très divergentes et très longues, bien plus sinueuses, atteignent les 2/3 de la distance de l'épistome au bord occipital (dépassent un peu la moitié de cette distance chez le *claviscapus*). Les yeux sont situés encore un peu plus en arrière et la tête est un peu plus longue. Face déclive du métanotum verticale, passant par une courbe brusque à la face basale qui est longue et peu convexe (chez le *claviscapus*, la face basale est très convexe et passe insensiblement à la face déclive). Du reste, comme le *claviscapus*, mais moins luisant, plus fortement ponctué et d'un jaune roussâtre bien plus vif, tandis que l'abdomen n'a qu'une faible apparence de bandes transversales un peu brunâtres. Le *C. improprius* est plus grand, a l'épistome fort élargi devant, les mandibules sans impression, les yeux situés bien en avant du tiers postérieur, les arêtes frontales bien plus courtes, la ponctuation plus faible et l'écaille plus mince et plus tranchante. Les trois espèces ont le scape clavé.

♂ minor. — Long. 4 à 5 mill. — Tête plus allongée que chez le *claviscapus*, du reste fort semblable; mandibules armées de 6 dents. La forme du thorax, etc., la couleur et la sculpture comme chez la grande ouvrière.

Jardin botanique de Kingston, Jamaïque, sous l'écorce du même arbre que le *Camp. Capperi* r. *corticalis*, nichant aussi comme un *Leptothorax*, et fort timide.

31. *C. silvicola* n. sp. — ♂ major. — Long. 10 à 11,5 mill. — Mandibules plutôt petites, luisantes, finement chagrinées, avec de gros points abondants, peu courbées, armées de 7 dents. Épistome trapéziiforme, caréné, lobé, à lobe rectangulaire, à bord antérieur droit au milieu. Tête trapéziiforme, élargie et excavée derrière, à côtés plus convexes que chez le *conspicuus*, avec les arêtes frontales bien plus divergentes. Les scapes dépassent le bord occipital d'un quart de leur longueur; ils sont moins courbés et moins élargis vers l'extrémité que chez le *conspicuus* (et var. *zonatus*). Thorax plus bas et moins convexe que chez le *conspicuus*, du reste de même forme. Écaille assez épaisse, comme chez le *conspicuus*. Chez cette dernière espèce, l'épistome est étroit devant (presque aussi étroit que derrière), et les mandibules sont fortement courbées. Les tibias du *C. silvicola* sont cylindriques, un peu aplatis, sans petits piquants.

Luisant, faiblement chagriné (la tête du *conspicuus* est sub-opaque). La tête et le thorax ont de gros points enfoncés épars piligères, surtout abondants sur le devant de la tête, plus petits sur l'abdomen.

Tout le corps couvert d'une pilosité d'un jaune brunâtre, abondante, grossière, pointue, assez longue, surtout sur l'abdomen, rap-