

pelant celle du *C. abdominalis*. Mais sur les tibias et les scapes, cette pilosité est bien plus fine, bien plus courte et oblique. Pubescence jaunâtre, fine et très éparse, un peu plus abondante sur l'abdomen.

D'un jaune roussâtre. Mandibules, tarsi et de larges bandes transversales sur l'abdomen brunes; bord postérieur des segments abdominaux jaune. Dessus de la tête et des segments du thorax, cuisses et antennes d'un roux terne ou d'un brun clair.

♂ minor. — Long. 7 à 8 mill. — Tête allongée, encore plus rétrécie derrière les yeux que chez le *C. substitutus*, lors même que le corps est moins grêle. Les scapes dépassent l'occiput de la moitié de leur longueur. Du reste comme chez la grande ♀; les joues et le devant de la tête ont aussi des poils abondants et plus courts que les autres. Les mandibules ont 6 dents.

Très voisine du *substitutus*, cette espèce s'en distingue surtout par sa pilosité bien plus forte (aussi sur les tibias et les scapes), sa sculpture et sa taille un peu plus robuste. D'aspect elle ressemble surtout au *C. conspicuus* v. *zonatus*, mais sa structure est fort différente.

Don Diego, nichant dans un tronc d'arbre de la forêt; Ouriheka.

32. *C. falco* n. sp. — ♂ minor. — Long. 4,2 à 5 mill. — Mandibules luisantes, faiblement ponctuées, peu courbées, armées de 6 dents. Tête plus longue que large, un peu plus large derrière que devant, à côtés parallèles devant les yeux qui sont situés fort près des angles postérieurs et sont gros, convexes. Derrière les yeux, la tête a un bord postérieur convexe. Épistome caréné, convexe, à lobe arrondi. Arêtes frontales divergentes, assez courtes. Le scape dépasse l'occiput de la moitié de sa longueur. Pronotum subdéprimé, bordé devant et aux angles antérieurs d'un bord distinct qui s'arrête aux angles antérieurs. Le reste du dos du thorax est plutôt comprimé, de forme arquée ordinaire, sans trace de bord. Mais la suture mésoménotale est obsolète et la convexité du thorax d'avant en arrière s'arrête un peu après le bord antérieur du ménotum, dont la face basale est rectiligne d'avant en arrière, comme chez le *C. pellitus*, mais plus courte et moins large, tandis que la face déclive est plus haute, subverticale, triangulaire, formant une courbe presque anguleuse avec la face basale (sans former cependant un angle comme le *sphenoidalis*). Écaille basse, épaisse (moins que chez le *pellitus*), à bord supérieur obtus et subtransversal. Les tibias sont armés de quelques petits piquants à leur face interne.

Densément réticulé et subopaque, y compris les pattes et les scapes. Abdomen plus luisant, plus faiblement sculpté, les réticulations devenant un peu transversales. Abdomen et thorax avec des points épars piligères un peu élevés, abondants.