

1. *Tetramorium guineense* Fab. — Très abondant dans le bois pourri et sous les pierres.

2. *Wasmannia auropunctata* Roger. — ♂, ♀. — Coteaux au fond de la baie de Chatam. Plantes herbacées, humus, arbustes. Extrêmement abondantes en ce lieu, mais pas dans le reste de l'île.

3. **Camponotus Biolleyi** n. sp. — ♂ major. — Long. 5 à 6 mill. — Très voisin du *C. Lindigi* Mayr, et avec la même forme de thorax moins bordé, le distinguant du groupe *senex*. Mais il est moins dimorphe que le *Lindigi*; la grande ♂ est moins grosse et a surtout la tête moins grosse, plus allongée, et bien moins élargie derrière, avec les côtés bien moins divergents; elle est seulement un peu plus large derrière que devant, où les joues assez larges ont une légère tendance à la forme des *novogranodensis*, *Chazaliei*, etc.

Mandibules avec 6 dents. Épistome subcaréné, à peine sublobé, biéchancré, avec une impression au milieu du bord antérieur. Yeux plus grands que chez le *Lindigi*, situés un peu plus en arrière. Tête assez faiblement échancrée derrière. Les scapes dépassent peu l'occiput, moins que chez le *Lindigi*. Thorax, et surtout métanotum, plus étroit et encore moins subbordé que chez le *Lindigi*; le métanotum est moins élevé, le passage de la face basale à la face déclive est plus progressif, moins distinct. Suture méso-métanotale peu distincte. Partie antérieure du profil du dos du thorax un peu plus convexe, partie postérieure plus convexe que chez le *Lindigi*. Écaille bien plus étroite que chez le *Lindigi*, nullement courbée, verticale, à face postérieure perpendiculaire, à face antérieure faiblement convexe et à bord supérieur obtus, beaucoup plus convexe d'un côté à l'autre.

La sculpture est identique à celle du *C. Lindigi*, en particulier les points transversaux de l'abdomen, l'éclat, etc., mais la ponctuation espacée de la tête est plus régulière et un peu plus abondante.

Pilosité plus jaunâtre et un peu plus abondante, surtout sur la tête, l'abdomen et les tibias où elle est courte et demi-couchée (pubescence soulevée). Pubescence courte, distincte au fond des points de la tête.

Noir; pattes, tête et antennes d'un roux ferrugineux bien plus terne que le rouge du *Lindigi*. Occiput, vertex, tarsi et deuxième moitié du funicule brunâtres ainsi que le devant du pronotum.

♂ minor. — Long. 3,8 à 4,6 mill. — Bien distincte du *Lindigi* par son thorax beaucoup plus étroit, à peine subbordé, sauf au pronotum, sa suture méso-métanotale presque obsolète, son écaille verticale, sa tête plus allongée et ses yeux bien plus gros. Du reste, comme la grande ♂, mais les hanches sont d'un noir brun. Le