

devant de la tête est aussi d'un roux plus jaunâtre, ainsi que les pattes et les antennes (sauf leur extrémité brune).

♂. — Long. environ 5,7 mill. — Entièrement noir, avec les pattes et les antennes brunes, les mandibules et le bord antérieur de la tête d'un brun roussâtre, les ailes subhyalines à tache et nervures plutôt pâles. Écaille basse. Pilosité jaunâtre, assez limitée à la tête, au métanotum et à la moitié postérieure de l'abdomen.

La forme du thorax de l'ouvrière est encore plus large et moins comprimée que chez le groupe des *Camponotus* comprimés; son dos est faiblement subbordé, quoique bien moins distinctement que chez le *Lindigi*, de Colombie, avec lequel cette espèce a des affinités indubitables et dont elle paraît dériver.

Branches sèches. Abondant sur les fougères qui forment le sous-bois de l'île.

4. *PRENOLEPIS GUATEMALENSIS* Forel, var. *cocoensis* n. var. — ♀. — Semblable à la var. *itinerans* Forel, de même forme et de même taille. Mais la couleur est un peu plus terne, les pattes (surtout les tibias) sont brunâtres, l'éclat est plus faible, et les soies sont un peu plus longues et plus abondantes que chez elle et chez le type. Le métanotum est aussi un peu plus élevé, plus bossu que chez le type et l'*itinerans*, avec la suture méso-métanotale plus profonde. Les pattes et les soies foncées, contrastant avec le corps jaunâtre, frappent dès l'abord.

Tronc de cocotier. Aisselle des feuilles.

La première espèce est un cosmopolite des tropiques; la deuxième est très commune dans l'Amérique centrale et les Antilles; la troisième paraît appartenir à la faune locale, et la quatrième est une variété locale d'une espèce de l'Amérique centrale. Je ne connais pas le *Camponotus macilentus* Smith, des Galapagos; les *planus* Em. et *peregrinus* Em., des mêmes îles, sont voisins du *quadrilaterus* Mayr, de l'Amérique tropicale.

**Camponotus Mocsaryi** n. sp. — ♀ minor-media. — Long. 10 mill. — Mandibules armées de 6 (7 ?) dents, lisses, luisantes, avec quelques points épars. Épistome caréné, avec un lobe rectangulaire. Tête subrectangulaire - arrondie et légèrement élargie derrière, bien plus longue que large. Scapes longs et grêles, dépassant l'occiput de la moitié de leur longueur, légèrement aplatis. Thorax grêle, étroit, allongé, à peine convexe, à sutures très distinctes, à peine plus large devant que derrière. Métanotum relativement large, à face déclive très courte, passant à la basale par une courbe très arrondie. Pédicule surmonté d'un nœud cunéiforme, plus ong qu'épais, à bord supérieur obtus et à pan antérieur plus faiblement incliné que le postérieur et terminé devant, en bas, par une courte