

troncature verticale. Premier segment de l'abdomen fort abaissé devant. Cuisses, tibias et métatarses, surtout les tibias, fortement aplatis et assez élargis, plus encore que chez le *C. Petersii* Em. d'Afrique. Pattes longues, tibias sans piquants.

Corps entièrement mat, densément et finement chagriné; tête finement réticulée - ponctuée. Pattes et scapes luisants, finement chagrinés. L'opacité du corps tient à une hyposculpture microscopique, comme je l'ai fait remarquer depuis longtemps.

De longs poils dressés, d'un brun noirâtre, épais, mais pointus à l'extrémité, sont épars sur l'abdomen, très rares sur le thorax, mais forment une houppé peu dense sur le vertex et l'occiput. Les pattes ont des poils noirâtres, épais, sétiformes, obliques, assez courts, assez pointus et assez abondants. Pubescence adjacente jaunâtre, fine, plutôt longue, médiocrement abondante, trop espacée pour former un duvet.

Corps d'un roux ferrugineux homogène, un peu plus foncé sur la tête. Mandibules et antennes brunes. Pattes noirâtres.

Jenceboa ad Amazonas, Brésil.

Musée de Budapest. Reçu par M. Mocsary.

### III. Une *Trapeziopelta* de l'île de Key.

✓ *Trapeziopelta Kühni* n. sp. — ♀. — Long. 6,5 mill. — Les mandibules sont d'abord élargies vers le milieu, comme chez la *T. bidens* Em. Mais les deux dents moyennes sont disposées autrement, la première étant située un peu après le milieu de la longueur, et la deuxième près des deux dents apicales. Vers le tiers basal, le bord interne de la mandibule qui s'élargit forme un feston à peine subdentiforme. Labre avec une dent pointue au milieu. Le lobe avancé de l'épistome est très court, moitié plus court au moins que chez la *bidens*, trapézoïdiforme; à bord antérieur un peu concave. Tête presque carrée, au moins aussi large que longue, légèrement plus large derrière que devant, fortement excavée derrière, avec les angles arrondis, mais très marqués. Prolongé jusqu'à l'ocelle antérieur, le sillon frontal forme une grande fossette devant lui et autour de lui. Scapes n'atteignant pas tout à fait l'occiput. Massue assez distinctement de 4 articles; articles 2 à 7 du funicule un peu grenus, aussi larges que longs. Les yeux couvrent  $\frac{1}{4}$  du côté de la tête. Dos du thorax assez déprimé et subrectiligne. Face déclive du métanotum tronquée, obtusément bordée. Nœud du pédicule bien plus large que long, tronqué devant et derrière, plus large derrière que devant. Abdomen fortement rétréci après le premier segment.