

RECORDED
IN ANTIBUS

VARIÉTÉS MYRMÉCOLOGIQUES

par A. Forel.

I. — Quelques Formicides nouveaux de l'Inde.

Camponotus (Colobopsis) Longi n. sp. — ♀. — Long. 9 mill. — Tête tronquée devant comme chez le *truncatus*, mais le bord de la surface tronquée n'est aigu que le long des mandibules et sur le côté des joues; sur l'épistome et derrière les joues, il forme une courbe fort obtuse. La portion médiane de l'épistome a des côtés rectilignes qui divergent en arrière et un sillon médian, distinct derrière; sa partie postérieure, située en arrière de la surface tronquée de la tête, est deux fois plus large que longue. Aire frontale indistincte. Les arêtes frontales, extrêmement écartées, plus rapprochées du bord de la tête que du sillon frontal, forment une seule courbe arquée, convexe en dehors. Scape distinctement clavé, subdéprimé, avec l'épaississement apical allongé. Tête rectangulaire, échancrée derrière, d'un quart à un tiers plus longue que large, avec une fossette en lieu et place de chaque ocelle. Yeux plats, obliques, allongés, près du bord postérieur. Suture pro-mésotale très profonde, formant une petite échancrure du profil du thorax. Segment intermédiaire assez distinct. Échancrure entre lui et le métanotum assez forte. Métanotum subcubique, à face déclive subverticale, mais passant par une courbe à la face basale qui est plus large que longue, un peu convexe et un peu inclinée d'arrière en avant. Écaille très épaisse, largement et distinctement échancrée au sommet. Cuisses renflées, les antérieures très fortement. Métatarses un peu élargis à l'extrémité. Finement chagrinée et peu luisante; abdomen plus luisant. La surface tronquée de la tête, y compris les mandibules, et les côtés de la tête parsemés de larges points ou fossettes espacées, peu profondes, microscopiquement sculptées au fond et portant chacune un très petit poil adjacent. Front (pas l'épistome) presque mat; les fossettes y sont très grossières et en partie confluentes, formant de grossières réticulations. Occiput, comme le reste du corps, sans grosses fossettes, avec une fine ponctuation très éparse. Pilosité dressée extrêmement éparse sur le corps, nulle sur les tibias et les tarses. Pubescence très courte et très espacée. Noir. Surface tronquée de la tête et bord adjacent de la partie non tronquée, avec les mandibules, d'un rouge sombre. Tibias brunâtres, ainsi que les funicules et l'extrémité des scapes. Reste des scapes, tarses et articulations d'un roux jaunâtre ou brunâtre. Devant du deuxième segment abdominal, ainsi qu'une