

tache de chaque côté du premier et du troisième segment d'un blanc jaunâtre.

♂. — Long. 4,5 à 5 mill. — Très semblable au *C. Cotesii*, dont il diffère comme suit : Tête à peine rétrécie devant (assez fortement rétrécie chez le *Cotesii*). Scapes plus dilatés et plus déprimés vers l'extrémité. Yeux plus grands, plus larges que l'espace qui les sépare de l'angle occipital (à peine aussi larges chez le *Cotesii*). Le scape dépasse l'occiput de plus d'un tiers de sa longueur (de moins chez le *Cotesii*). La forte suture pro-mésotonale forme une petite échancrure du profil du thorax (ne la forme pas chez le *Cotesii*). Échancrure méso-métanotale beaucoup plus profonde. Segment intermédiaire très distinct (tout à fait indistinct chez le *Cotesii*). Face basale du métanotum bien plus large et bien moins comprimée. Écaille très épaisse, subcubique, aussi longue que large, à bord postérieur échancré et obtusément bidenté (squamiforme et comprimée d'avant en arrière chez le *Cotesii*). Le premier segment de l'abdomen et souvent le second ont une tache blanc jaunâtre de chaque côté. Bien moins luisante que le *Cotesii*, subopaque; assez fortement réticulé, çà et là presque réticulé-ponctué, sauf l'abdomen qui est luisant et faiblement ridé en travers.

Du reste comme le ♀, mais la tête n'a que sur les joues quelques grosses fossettes effacées et n'est tronquée que comme chez l'ouvrière du *truncatus*. Sauf les taches abdominales indiquées, la couleur est noire, avec les scapes et le premier article des funicules jaunâtres sales, le reste du funicule et les pattes d'un brun foncé. Mandibules rougeâtres.

Assam (Long); Garo Hills, Assam (Long); Cherapoonji, Assam (Nissor). Le ♀ a été pris seul dans cette dernière localité, ce qui fait que je ne suis pas absolument certain qu'il appartienne à l'ouvrière, mais il y a peu de doute.

CAMPONOTUS BINGHAMII Forel. — ♂ major. — Long., 6,3 à 7 mill. — Tête absolument rectangulaire, échancrée devant et derrière, d'un fort quart plus longue que large, subtronquée devant. Mandibules armées de 6 dents, ponctuées, striolées ou chagrinées et mates vers leur base. Portion médiane de l'épistome bien plus longue que large, élargie en arrière où ses côtés sont convexes, imprimée devant et faiblement sillonnée au milieu de sa moitié postérieure. Yeux un peu en avant du tiers postérieur. Mésotonum très distinctement subbordé. Écaille épaisse, mais moins obtuse au bord supérieur que chez la ♀ minor. Devant de la tête réticulé-ponctué, mat, parsemé de grosses fossettes allongées, irrégulières et piligères et abondamment hérissé de soies jaunâtres, courtes, épaisses, obtuses et très abondantes qui font à peu près défaut à l'ouvrière minor. Épistome et joues d'un jaune roussâtres. Antennes entièrement brunes,