

sauf la base roussâtre des scapes. Tête moins pubescente que chez l'ouvrière minor. Du reste comme cette dernière:

Moulmain, Birmanie (Hodgson). Prise avec l'ouvrière minor.

CAMPONOTUS SELENE Emery (= *Polyrhachis selene* Em.). — Upper Assam (Lindgreen). Sous l'écorce.

Camponotus crassisquamis n. sp. — ♂ major. — Long. 8 mill. — Mandibules armées d'environ 7 dents, lisses, chagrinées vers la base, avec des points épars. Épistome caréné le long de son tiers médian seulement, avec un lobe rectangulaire fort court. Tête fort grande relativement au corps (comme chez le *Landolti* ou l'*odiosus*), fortement rétrécie devant, excavée derrière, avec les côtés fort convexes. Yeux peu convexes, un peu en arrière du milieu et situés assez de face (peu latéraux). Les scapes dépassent l'occiput de $\frac{1}{3}$ de leur longueur. Dos du thorax également voûté. Sutures profondément imprimées, interrompant toutes deux légèrement le profil. Métanotum peu comprimé; une faible courbe passe d'une face à l'autre; la basale plus longue. Écaille très épaisse, basse, subnodiforme, surtout extrêmement obtuse à son bord supérieur; elle ressemble plus à celle d'une *Bothroponera tesserinoda* ou *sulcata* ♂ qu'à celle d'un *Camponotus* ♀. Tibias grêles, sans piquants.

Finement chagrinée et médiocrement luisante, avec l'abdomen plus luisant, de grosses fossettes allongées, peu profondes sur le devant de la tête, surtout sur les joues, et des points piligères épars, surtout distincts sur l'abdomen. Une longue pilosité dressée assez grossière, roussâtre avec l'extrémité jaunâtre, assez abondante sur la tête, le dos du thorax, le dessus et le dessous de l'abdomen, plus courte sur les joues. Pubescence jaunâtre, espacée, mais fort distincte et répandue partout, surtout sur le thorax et l'abdomen, oblique sur les tibias et les scapes qui n'ont pas de poils dressés.

D'un noir brunâtre avec un reflet bleuâtre un peu moins fort que chez la *Lobopelta chinensis*, mais analogue. Angles occipitaux, bord des mandibules, funicules et paltes brunâtres. Bord des segments abdominaux d'un jaune roussâtre.

♀ minor. — Long. 5,5 à 6,7 mill. — L'épistome est subcaréné ou même n'a souvent qu'une éminence subcarénée vers son extrémité postérieure et un lobe plutôt trapézoïdiforme ou arrondi. Mandibules avec 6 à 7 dents. Tête aussi large derrière que devant, à bord postérieur convexe. Les scapes dépassent l'occiput de la moitié de leur longueur. Yeux assez convexes. Écaille encore plus épaisse que chez la ♀ major, surtout vers le bas. Du reste comme la grande ♀, mais avec les fossettes des joues plus petites et plus effacées, la pilosité et la pubescence plus diluées.

Assam (Smythies).

Espèce voisine de *maculatus* et *Landolti*.