

CAMPONOTUS OBLONGUS Smith. — ♂. — Long., 4,8 à 8 mill. — D'un brun rougeâtre, avec l'abdomen noir, à bords des segments jaunes. Pilosité extrêmement éparse, roussâtre. Correspond bien à la ♀ de *Jalpiguri* et à la description que Smith donne de la ♀. Les cuisses sont en effet un peu sémitransparentes. Les mandibules ont 7 dents chez la grande ♂, dont la tête est en trapèze, fort luisante, chagrinée, avec des points petits et fort espacés. L'occiput, faiblement échancré, est légèrement dépassé par les scapes. Une rangée de petits piquants à la face interne des tibias. Écaille large, à bord supérieur assez obtus. La tête de la petite ouvrière est rectangulaire, à peine plus longue que large. L'épistome sans carène forme un lobe rectangulaire médian très court. Cette forme est entre les groupes *herculeanus* et *maculatus*.

Pubar Valley, provinces du nord-ouest de l'Inde, 7,000 pieds (Rogers). — Jusqu'ici la ♀ seule était connue.

CAMPONOTUS MACULATUS r. **somnificus** n. st. — ♂. — Très voisin du *mitis* v. *fuscithorax*, et de même taille, mais entièrement noir, avec les hanches, les anneaux fémoraux et les funicules roussâtres. Entièrement mat, abdomen tout au plus subopaque; la sculpture bien plus forte et plus dense que chez le *mitis*; points espacés bien plus forts et plus abondants. La pilosité dressée et la pubescence sont aussi plus abondantes, surtout cette dernière qui est aussi plus longue. Les tibias ont des poils obliques abondants; ils sont cylindriques, sans piquants. L'écaille est plus mince que chez le *fuscithorax*. Cette race ressemble un peu à un petit *Lamarkii*.

Coonor, Nilgiris (Wroughton).

CAMPONOTUS MACULATUS r. **Lobinieri** n. st. — ♂. — Très semblable d'aspect à la var. *crassinodis* du *mitis*, dont il a l'écaille et la couleur, mais foncièrement différent: un peu plus grand et plus svelte. Tibias prismatiques, cannelés et armés à leur côté interne d'une série de piquants. Lobe de l'épistome à côtés légèrement concaves. Pilosité et pubescence beaucoup plus faibles et plus diluées; pubescence absolument adjacente sur les tibias et les scapes; joues sans poils dressés. Sculpture assez forte, mate ou subopaque. Tout différent du *dichrous-kattensis*. Couleur entre *crassinodis* et *fuscithorax*. — Long. 6,3 (♂ minor) à 8 mill. (♂ media).

Cachemire (Lobinière).

CAMPONOTUS SIEMSENSI Forel. — Toria Valley, 3,500 pieds, Himalaya (Smythies). Les plus petites ♂ n'ont que 5 mill. et ressemblent beaucoup à la r. *junctus* du *maculatus*; la grande ♂ a 12 mill. Les mandibules des individus de l'Himalaya sont striées entre les points (var. *dispar* n. var.). A part cela identique au type de Sumatra que M. Emery a aussi reçu de Phuc-son en Annam.