

CAMPONOTUS BARBATUS Roger r. TAYLORI Forel. — L'étude des différentes formes de l'ouvrière et surtout du vrai *barbatus* typique, reçu de Coonor, dans les Nilgiris, par M. Wroughton, me prouve que mon *Taylori* est une race imberbe de cette espèce et non du *maculatus*. L'épistome est plus étroit et la tête est plus allongée que chez le *maculatus*, plus large de joues.

CAMPONOTUS DORYCUS r. Carin Em. Assam (Smylhies). — R. *Simoni* Em. Je suis d'avis, comme M. Emery le suppose lui-même du reste, que le *C. Simoni* n'est qu'une race du *dorycus*, très voisine du *carin*.

Camponotus Gretae n. sp. — ♀. — Long. 13 mill. — Mandibules courtes, épaisses, luisantes, finement ponctuées, armées de 7 dents, dont la postérieure est sur le bord interne. Tête nullement tronquée, ni subtronquée, en trapèze, largement et faiblement échancrée derrière, rétrécie devant. Épistome fortement biéchancré, sans lobe avancé, mais son milieu proémine en convexité subacuminée entre les deux échancrures, sans dépasser les côtés. Il a la forme du s.-g. *Colobopsis*, formant une portion médiane bien plus longue que large, à côtés subparallèles, divergeant un peu en arrière, échancrée au milieu du bord postérieur. Aire frontale indistincte. Les arêtes frontales, très écartées dès leur base, continuent exactement les côtés de la portion moyenne de l'épistome et sont fortement divergentes. Scapes épaissis sur leur tiers apical, dépassant légèrement l'occiput. Mésonotum grand, avec deux sillons parallèles. Métanotum convexe. Écaille large, échancrée au sommet, plutôt épaisse. Tibias sans piquants, faiblement comprimés, non prismatiques.

Finement chagriné et assez luisant, çà et là un peu subopaque. Pas de sculpture grossière sur le devant de la tête; seulement des petits points espacés. Pilosité dressée, d'un roux jaunâtre, fort dispersée, un peu plus abondante sur le front et le vertex, nulle sur les tibias et les tarses qui n'ont qu'une pubescence un peu soulevée ou oblique. Pubescence du reste très dispersée.

Abdomen et thorax mêlés de brun et de roussâtre, tête roussâtre ainsi que les antennes. Mandibules plus foncées. Pattes et écaille jaunâtres. Ailes longues, subhyalines, avec les nervures et la tache d'un roux jaunâtre assez pâle.

Icaungy Valley, Birmanie (M. Bingham); 1 exemplaire envoyé par M. Wroughton.

L'épistome de cette espèce à tête non tronquée, est si caractéristique et si différent de toutes les autres espèces de l'Inde, que je me hasarde à la décrire sans connaître l'ouvrière.