

plus convexe latéralement que chez *tubericeps*. La tête a de chaque côté, derrière l'œil, un tubercule subdentiforme analogue à celui de la *tubericeps*, mais un peu moins large et plus rapproché de l'œil. Épines du pronotum beaucoup plus longues que chez la *tubericeps* et un peu courbées en bas. Derrière elles, le pronotum forme une véritable bosse de dromadaire, bien plus forte que la convexité de la *tubericeps*. Suture pro-mésnotale distincte. La suture mésoménotale est obsolète et remplacée par un fort bourrelet transversal recourbé latéralement en avant, et qui s'abaisse graduellement devant et derrière. Derrière ce bourrelet la face basale du ménotum est concave. Épines ménotales très épaisses, longues, subverticales, d'abord subparallèles, puis fortement recourbées en dehors en cornes de chamois luisantes et très recourbées, tandis que leur longue base est mate. Face déclive aussi longue que la basale. Thorax non bordé (groupe *armata*). Écaille basse, armée de deux longues épines courbes, dirigées en arrière et en haut, embrassant en partie le devant de l'abdomen. Pas de dents entre ces épines. Abdomen non bordé.

Entièrement réticulée-punctuée et mate, y compris les membres, sauf la pointe des épines. Le thorax a en outre de grosses rugosités réticulaires, l'occiput, le vertex et le front des fossettes espacées et un peu effacées, mais abondantes, portant chacune un poil couché court. Entre l'œil et l'arête frontale, quelques rides. Pilosité dressée nulle, sauf deux ou trois poils aux deux extrémités du corps. Pubescence très diluée, courte et jaunâtre, un peu plus abondante sur l'abdomen. Entièrement noire; dents des mandibules et crochets des tarses bruns.

Moulmain, Birmanie (Hodgson).

Les tubercules de la tête, les bosses du thorax jointes aux cornes de chamois du ménotum distinguent cette espèce de toutes les autres. Elle est parente de *tubericeps*, *d'arachne* et de *rupicapra*.

FORMICA FUSCO-RUFIBARBIS For. — Provinces du nord-ouest de l'Himalaya (Smythies).

LASIVUS FULIGINOSUS Ltr. — Konkan septentrional (Wroughton).

Prenolepis Naoroji n. sp. — ♀. — Long. 3,5 mill. — Rapprochée de *Jerdoni* Em., dont elle diffère par ses yeux convexes, un peu moins grands, par son mésnotum moins rétréci, par l'abondance de ses longs poils sur tout le corps et par son pédicule moins allongé, à écaille plus élevée et moins épaisse. Elle forme le passage entre les *Prenolepis* de forme ordinaire et le groupe de la *Jerdoni*.

Tête assez ovale (un peu ovale-rectangulaire), petite. Les yeux gros et convexes sont situés en arrière du milieu et n'occupent pas