

le tiers des côtés de la tête (chez la *P. Emmae* ils sont beaucoup plus petits, plus antérieurs et situés plutôt en avant du milieu). Thorax fortement échancré. Le rétrécissement mésonotal est intermédiaire entre celui de la *Pr. Yerburyi* p. ex. et celui de la *Jerdoni*. Mais la conformation est plutôt *Jerdoni*. La convexité métanotale n'est pas beaucoup plus courte que l'antérieure. Mésonotum à peine déprimé en selle. Écaille assez épaisse et inclinée, mais tranchante au sommet; pédicule plus allongé que chez l'*indica*. Abdomen tronqué devant, avec une loge pour l'écaille, comme chez l'*Emmae*, mais sans former d'angles saillants. Les scapes dépassent l'occiput d'un peu plus de la moitié de leur longueur.

Très luisante et assez lisse. Abdomen faiblement chagriné. De très longs poils fauves courbés, fins et pointus, assez abondants sur tout le corps. Les tibias et les scapes n'ont qu'une pilosité courte, oblique (subadjacente).

D'un brun jaunâtre sale avec les tarsi et les articulations plus clairs. Abdomen brun.

Assam (Smythies). Provinces du nord-ouest de l'Inde (Smythies). L'exemplaire de cette dernière provenance est entièrement brun et a les poils un peu moins fins et moins courbés.

**Prenolepis birmana** n. sp. — ♀. — Long. 3 mill. — Mandibules étroites, croisées, à bord terminal très oblique, armé de 5 dents. Tête étroite, bien plus longue que large, ovale-rectangulaire, aussi large devant que derrière. Yeux un peu en avant du milieu et plus petits que chez la *longicornis*. Les scapes dépassent l'occiput d'un peu plus de la moitié de leur longueur. Articles du funicule au moins trois fois plus long qu'épais. Thorax allongé comme chez la *longicornis*, mais un peu plus convexe et plus robuste. L'échancrure méso-métanotale est beaucoup plus forte et le métanotum plus convexe et plus court, formant une bosse dont la face déclive est un peu plus longue que la basale. Abdomen moins avancé devant et moins tronqué que chez la *longicornis*, un peu plus grand. Pattes bien plus épaisses, plus robustes que chez la *longicornis*.

Tête, thorax et membres subopaques, finement et irrégulièrement réticulés; métanotum assez lisse derrière. Abdomen chagriné, plus luisant.

De longues soies raides, d'un brun noirâtre, à peine pointues au bout, semées sur tout le corps, les pattes et les scapes, où elles sont bien plus épaisses et plus abondantes que chez la *longicornis*. Pubescence peu abondante, surtout visible sur les pattes et les scapes.

D'un brun foncé, noirâtre. Abdomen presque noir. Articulations, tarsi et extrémité des mandibules jaunâtres.

Moulmain, Birmanie (Hodgson).