

Voisine de la *longicornis*, mais bien distincte; plus robuste, plus grande, avec une autre forme du métanotum. Sculpture et pilosité tout autres.

Var. **Hodgsoni** n. var. — ♀. — Long. 2,4 à 2,6 mill. — Pattes et antennes plus courtes. Les scapes ne dépassent l'occiput que d'un peu moins de la moitié de leur longueur. Les articles du funicule ne sont qu'un peu plus de deux fois plus longs que larges. Du reste comme la forme typique.

Même localité.

**Prenolepis aseta** n. sp. — ♀. — Long. 2,3 à 2,5 mill. — Aspect d'un *Iridomyrmex*. Mandibules assez mates, finement sculptées, avec 6 dents souvent rapées. Épistome faiblement échancré au milieu du bord antérieur, subcaréné. Aire frontale distincte, triangulaire. Fosse clypéaire distincte de l'antennaire. Tête presque carrée, à côtés convexes, échancrée derrière. Yeux plats, assez petits, situés distinctement en avant du milieu des côtés. Les scapes dépassent l'occiput d'un quart de leur longueur. Antennes de 12 articles; funicule épaissi vers son extrémité, avec les articles 2 et 3 subégaux et les articles 4 à 7 un peu plus épais que longs. Échancrure mésométanotale très faible, contenant deux stigmates un peu proéminents. Face déclive du métanotum plus de deux fois plus longue que la basale, à laquelle elle passe par une courbe très courte, subanguleuse, ressemblant un peu au métanotum des *Technomyrmex*. Écaille fort inclinée; l'abdomen a devant une loge peu profonde pour l'écaille; il n'est pas distinctement tronqué. Son segment apical a un anus rond, apical et cilié.

Luisante, faiblement réticulée ou ponctuée, recouverte d'un duvet de pubescence d'un gris jaunâtre, ne cachant pas tout à fait la sculpture et plus clairsemé sur le thorax. Pilosité dressée jaunâtre, assez fine, pointue, très clairsemée sur le corps, *nulle sur les tibias et les scapes* qui n'ont que la pubescence.

Tête et abdomen d'un brun jaunâtre. Le reste d'un jaune roussâtre ou brunâtre sale, avec l'extrémité de chaque article du funicule brune et les pattes plus claires, plus jaunes.

Darjeeling, de 3,000 à 8,000 pieds (Wroughton).

Cette singulière espèce ressemble à première vue bien plutôt à un *Iridomyrmex* ou à un *Bothriomyrmex* qu'à une *Prenolepis*. Cependant sa position générique ne peut être douteuse.

**PRENOLEPIS TAYLORI** Forel. — Ceylan (Yerbury). Thana (Gleadow).

**PRENOLEPIS INDICA** Forel. — Calcutta (Niceville). Coonoor (Wroughton). Madras (Daly). Hyderabad (Bularmo).

**Plagiolepis Rothneyi** r. **Wroughtonii** n. st. — ♀. — Long. 1,7 à 2,7 mill. — Épistome avec une carène très proéminente.