

large que la tête; pronotum bas, court; métanotum bas, ne formant qu'une seule convexité faible, déprimée. Aile supérieure longue de 10 mill., sans cellule discoïdale, à cellule radiale fermée, la nervure transverse s'unissant au rameau cubital externe seul.

Lisse, luisante, avec des points épars partout et quelques stries très fines et courtes sur le front. Pilosité dressée assez inégale, courte, assez abondante partout, y compris les pattes et les scapes; pubescence presque nulle.

Noire; scapes et pattes d'un brun de poix; mandibules, funicules, tarses, arêtes frontales et bord postérieur des segments abdominaux roussâtres. Ailes brunâtres, avec les nervures brunes et la tache d'un brun foncé.

Santos, Brésil, récoltée par M. le Dr Arthur Müller.

Voici la façon dont se distinguent les ♂ de diverses *Myrmelachista* de ma collection ayant toutes dix articles aux antennes :

- | | |
|--|---------------------------|
| Pédicule surmonté d'une écaille comprimée | 1 |
| Pédicule surmonté d'une écaille épaisse, cunéiforme | 4 |
| Pédicule surmonté d'un nœud aussi long ou plus long que haut | 5 |
| 1. Tête aussi large ou presque aussi large que longue | 2 |
| Tête rectangulaire, faiblement élargie derrière, au moins d'un quart plus longue que large. Long. 2,5 à 3,4 mill. Tête assez déprimée, yeux grands, plats, situés vers le milieu des côtés. Le scape atteint le tiers postérieur de la tête. Aire frontale triangulaire, distincte. Sillon frontal faiblement prolongé jusqu'à l'occiput. Le dos du thorax, subhorizontal, n'a que deux faibles échancrures à son profil, l'une vers les 3/5 postérieurs du mésonotum (ou plutôt entre le mésonotum et le segment intermédiaire), l'autre entre ce dernier et le métanotum. Face basale presque carrée, subhorizontale, un peu plus longue que la face déclive, et y passant par une forte courbe. Écaille large, subverticale, droite ou largement échancrée au sommet, un peu moins haute que la face basale. Abdomen fort allongé. Très densément réticulé-punctuée et mate; abdomen et pattes finement réticulés et assez luisants. Pilosité dressée presque nulle; une pubescence jaunâtre, adjacente, assez longue, très distincte, dispersée sur tout le corps et sur les membres. Noire. Pattes, antennes et mandibules brunes. <i>Valparaiso (Chili)</i> M. Hoffmanni n. sp. | |
| 2. Tête et thorax mats, finement et densément sculptés. Long. 2,2 à 2,8 mill. <i>Costa-Rica</i> | M. ZELEDONI Emery. |
| Tête et thorax luisants. A peine 2 mill. | 3 |