

3. Convexité promésonotale allongée. Une profonde échancrure entre le mésonotum et le segment intermédiaire dont les stigmates proéminent; une plus faible entre ce dernier et le métanotum. Écaille assez épaisse. Cuisses assez renflées. Les scapes sont loin d'atteindre le bord occipital. D'un brun sale, un peu jaunâtre. *Colombie*.

M. SCHUMANNI Emery.

Convexité promésonotale forte, courte. Métanotum abaissé, subhorizontal, ainsi que le segment intermédiaire, dont une faible suture seule le sépare; stigmates peu proéminents. Écaille mince, verticale, tranchante et échancrée au sommet. Seules les cuisses antérieures un peu renflées. Les scapes approchent du bord occipital. Tête carrée, à côtés convexes. Aire frontale plus large que haute. Sillon frontal indistinct. Tête et thorax très distinctement chagrinés, moins luisants que chez la *M. Schumanni*. Pilosité fine, éparse sur le corps, oblique sur les membres. Pubescence presque nulle. D'un brun noirâtre, avec les mandibules, le devant de la tête et les articulations du thorax rougeâtres. Pattes et massue brunes; le reste des antennes, les tarsi et les articulations roussâtres. Long. 1,9 mill. *Corcovado, prov. Rio-Janeiro (Göldi)* . . . . . M. Bettinæ n. sp.

4. Long. 2,1 à 2,8 mill. — Tête carrée, à côtés faiblement convexes, un peu élargie derrière. Yeux en arrière du milieu. Les scapes atteignent presque le bord occipital qui est assez convexe. Aire frontale grande et distincte, ainsi que le sillon frontal. Mésonotum extrêmement rétréci (étranglé), comme chez une *Acantholepis* courte. Stigmates du segment intermédiaire proéminents. Face basale ascendante, élargie derrière, bien plus longue que la déclive qui est oblique. Écaille presque plus haute que le métanotum, verticale, assez épaisse au sommet qui est droit, très épaisse en bas. Abdomen court, convexe. Pattes longues. Tête et thorax mats, très densément et finement striés-ponctués en long, un peu soyeux. Le reste finement chagriné et assez luisant. Pilosité jaunâtre, assez longue, éparse, aussi sur les tibias et les scapes. Pubescence très diluée. D'un rouge ferrugineux; écaille jaunâtre. Abdomen brun foncé. Dessus de la tête, massue, tibias et cuisses brunâtres. Chez la ♀ minima l'occiput est luisant, faiblement sculpté *Alta da Serra, Prov. Rio-Janeiro (Göldi)*.

M. Rudolphi n. sp.