

5. Nœud du pédicule cunéiforme, à sommet anguleux . . . . . 6  
 Nœud du pédicule arrondi et très épais au sommet, comme  
 vers le bas. . . . . 7
6. Long. 3 à 3,7 mill. — Tête presque aussi large que longue,  
 à côtés très fortement convexes, à bord postérieur dis-  
 tinctement concave, avec un sillon occipital distinct,  
 allant jusqu'à la place de l'ocelle antérieur obsolète. Aire  
 frontale grande, très enfoncée, mais indistincte, arrondie  
 derrière. Sillon frontal court. Arêtes frontales courtes,  
 parallèles. Scape peu distant du bord occipital. Yeux aux  
 $\frac{3}{5}$  postérieurs. Thorax fortement échancré et rétréci  
 entre le mésonotum et le segment intermédiaire, mais  
 bien moins que chez la *M. Rudolphi*. Face basale plus large  
 que longue, de la longueur de la face décline qui est  
 oblique. Nœud bas, absolument cunéiforme, à sommet  
 tranchant et droit, à pan postérieur un peu plus long que  
 l'antérieur, plus long à sa base que haut. Abdomen court,  
 très pointu à l'extrémité. Pattes longues. Tête et thorax  
 subopaques (le second plus luisant), faiblement et fine-  
 ment réticulés, mais très finement pointillés au fond des  
 mailles. Nœud et abdomen luisants, finement chagrinés,  
 ce dernier avec des impressions éparses. Pilosité jau-  
 nâtre, assez longue, parsemée un peu partout, aussi sur  
 les tibias et les tarsi. Pubescence presque nulle. D'un  
 rouge vif, un peu jaunâtre; abdomen noir; pattes et  
 massue brunâtres. *Botucatu, Prov. Sao-Paolo, Brésil*  
 (Göldi). . . . . *M. Göldii* n. sp.
- Long. 2,8 à 3,4 mill. — Très voisin de la précédente, mais  
 scapes plus courts, tête plus rétrécie devant; sillon occi-  
 pital très indistinct, aire frontale distincte, non enfoncée,  
 arrondie derrière. Bord occipital moins concave. Échan-  
 crure thoracique plus allongée, ainsi que la face basale;  
 mésonotum moins convexe. Le nœud du pédicule a un  
 pan antérieur fort convexe qui le rend plus épais au  
 milieu, moins cunéiforme, avec le sommet plus obtus; le  
 pan postérieur est plus court, assez plan. Abdomen aussi  
 pointu, mais plus allongé. Tête et thorax plus mats, plus  
 densément sculptés. Pilosité très éparse, jaunâtre, fine,  
 oblique sur les tibias et les tarsi. Pubescence éparse,  
 distincte sur la tête. D'un noir à peine brunâtre. Thorax  
 et écaille d'un rouge brunâtre. Mandibules d'un jauné  
 brunâtre, ainsi que les articulations des membres.  
*Botucatu, Prov. Sao Paolo, Brésil* (Göldi).
- M. Kloetersi* n. sp.