

très peu de poils dressés, beaucoup moins que chez la *pratensis* d'Europe et même que chez la *rufa* typique. Je maintiens donc l'*obscuripes* comme race ou sous-espèce spéciale.

M. Whymper a trouvé sur le Vermillon Pass, en British Columbia, entre 5,000 et 6,500 pieds anglais de hauteur, une ♂ qui a absolument la couleur et l'aspect des formes foncées de la *F. pratensis* d'Europe (front, vertex, occiput et dos du pronotum et du mésonotum noirâtres), avec la même pubescence et la même sculpture, mais la pilosité très éparse (nulle sur les tibias) de l'*obscuripes*. Je crois devoir rattacher cette variété à l'*obscuripes*, et je l'appelle *Whymperi* n. var. L'*obscuriventris*, var. *melanotica* Emery, est très poilue et a une autre répartition des couleurs.

FORMICA SANGUINEA Ltr., r. RUBICUNDA Em., v. SUBNUDA Em. (1).  
— Vermillon Pass Alberta (Whymper), British Columbia. ♂.

FORMICA FUSCA L., r. SUBPOLITA Mayr, var. NEOGAGATES Em. — ♂♀. — Vermillon Pass, British Columbia, 5,000 à 6,500 pieds, et Alberta. Les exemplaires (19) de l'ouvrière sont tous très petits, de 3,8 à 4,7 mill. La ♀ a 7,6 mill.

FORMICA FUSCA L., var. SUBÆNESSENS Em. — ♀. — Long. 5,2 à 6,4 mill. — Vermillon Pass, British Columbia, 5,000 à 6,500 pieds. Donc; elle vit à côté de la précédente, de même qu'on trouve dans les prairies de Toronto, du Niagara et du Massachusetts la v. *subsericea* à côté de la *subpolita*.

FORMICA FUSCA L., var. NEORUFIBARBIS Em. — ♂, ♀. — Round about Field, Round Emerald Summit Lake, Vermillon Pass Alberta, Around Lake Louise, British Columbia (Whymper).

(1) FORMICA DACOTENSIS Emery, v. *Wasmanni* n. var. — ♀. Long. 5 à 7 mill. — Diffère du type de la *dacotensis* par sa tête distinctement échancrée derrière, surtout chez les ♂ maxima, un peu plus fortement rétrécie devant, avec les côtés plus droits (moins convexes).

♀. Long. 7 à 8 mill. — Tête beaucoup plus rétrécie devant, à côtés bien moins convexes que chez la ♀ de Hill City, avec une ponctuation espacée plus distincte. Entièrement d'un roux jaunâtre, avec une bande brune étroite à l'extrémité de chaque segment abdominal. Ailes légèrement jaunâtres, à nervures pâles.

♂. Long. 8 à 9 mill. — Les mandibules ont trois dents très obtuses. Tête beaucoup plus large que longue, très élargie derrière, très étroite devant. Noir, assez mat, pattes jaunâtres, ainsi que les valvules génitales. Antennes d'un brun noirâtre. La tête rappelle celle de la *Formica Adelungi* Forel, du désert de Gobi.

Prairie du Chien, Wisconsin, Muckemann; reçue par M. Wasmann.

Wasmann a décrit cette forme (Allg. Zeitschr. f. Entomologie, 1902) comme *F. dacotensis* Em. A mon avis, il s'agit, pour le moins, d'une variété.