

MYRMICA RUBRA, r. BREVINODIS Em., v. FRIGIDA Forel. — ♂. — Un très petit exemplaire, long de 3,6 mill. Vermillon Pass Alberta.

MYRMICA RUBRA, r. BREVINODIS Em., v. **Whymperi** n. var. — ♂. — Long. 4 à 5 mill. — Épines métanotales fort longues, beaucoup plus longues que l'intervalle de leurs bases, divergentes. Tête carrée, plus élargie derrière que chez la race typique.

Bord antérieur de l'épistome droit ou légèrement et très largement concave (plutôt légèrement convexe chez la *brevinodis*). Scapes beaucoup plus courts que la tête (plutôt plus courts que chez le type de la race). Sculpture plus forte, plus profonde; moins luisante. Sur la tête, les rides sont moins accentuées, et les gros points réticulaires, fortement enfoncés, le sont plus. Ces points sont bien plus séparés les uns des autres que chez la *sulcinodis* et ont moins le caractère de réticulations; le lobe antérieur des arêtes frontales est aussi plus développé latéralement (horizontalement) que chez la *sulcinodis* d'Europe. L'échancrure thoracique est souvent presque nulle, mais le mésonotum est un peu plus élevé que la face basale du métanotum. Quelques rides transversales entre les épines. Pilosité moins abondante que chez les types de la *brevinodis*. Tête et abdomen d'un noir brunâtre; le reste rougeâtre. Les scapes sont un peu plus brusquement courbés que chez la *brevinodis* typique.

Vermillon Pass, Alberta; Round about Field; Around Lake Louise; British Columbia (Whymper).

MYRMICA RUBRA, r. SCABRINODIS Nyl, v. **glacialis** n. var. — ♂. — Long. 3,3 à 4,3 mill. — Ressemble à une très petite *lobicornis* des Alpes. Scapes coudés presque à angle droit à la base, avec un petit lobe transversal dentiforme sur le coude. Épines métanotales longues et divergentes, bien plus longues que leur intervalle et que chez la *lobicornis*. Nœuds mats, densément réticulés-ponctués, avec quelques rugosités grossières, bien plus étroits que chez la *brevinodis*, l'antérieur plus longuement pétiolé. Sculpture très fortement rugueuse, comme chez la var. *fracticornis* Em., à laquelle elle ressemble; mais tous les articles du funicule sont au moins aussi longs qu'épais. Tête étroite, bien plus longue que large. Tête et abdomen d'un brun noirâtre; le reste d'un rougeâtre sombre.

Vermillon Pass Alberta, British Columbia (Whymper).

Carebara Junodi n. sp. — ♀. — Long. 23 mill. — Très semblable à la *C. vidua*, mais le thorax et l'abdomen plus étroits et plus allongés en proportion. La tête est plus triangulaire, plus élargie derrière et plus étroite devant. Sillon frontal bien plus profond.