

L'épistome, plus fortement et plus abruptement tronqué devant, a le bord supérieur de sa surface tronquée fortement et largement échancré, ce qui n'est pas le cas chez la *vidua* et var. *dux*. Arêtes frontales courtes, larges, formant un fort feston latéral, à peine marqué chez la *vidua*, et bien plus divergentes que chez cette espèce. Face basale du métanotum presque nulle au milieu. Métatarses postérieurs de très peu plus courts que les tibias (beaucoup plus courts chez la *vidua*).

Sculpture plus forte, les fossettes plus rapprochées et plus grandes que chez la *vidua*, surtout sur le thorax et l'abdomen. Le mésonotum a des rides dispersées, mais distinctes entre les fossettes. Pilosité et pubescence un peu moins abondantes que chez la *vidua*.

D'un roux terne, un peu brunâtre. Abdomen, pédicule, postscutellum, trois bandes longitudinales sur le dos du mésonotum et quelques taches vagues sur les côtés du thorax et le métanotum d'un brun foncé. Bord extrême des segments abdominaux roux. Les ailes manquent.

Peut-être voisine de *C. Sichelii* Mayr, que je ne connais pas, mais la ♀ de cette espèce n'a que 15 mill.

Shilouvane (Afrique), récoltée par M. H. Junod.

---