

dans les parties chaudes de la Suisse méridionale. Le fait est curieux et important. Le *C. lateralis* existe donc probablement en Allemagne.

III. — Formes nouvelles et synonymies.

Plagiolepis Deweti n. sp. — ♂. — Long. 2,5 à 2,7 mill. — Mandibules lisses, luisantes, avec de gros points épars, armées de 5 à 6 dents irrégulières. Épistome subcaréné, à bord antérieur convexe. Arêtes frontales courtes. Yeux assez gros, situés à peine en avant des côtés de la tête. Trois ocelles distincts. Tête ovale-rectangulaire, à bord postérieur arrondi et convexe de côté, à peu près droit au milieu. Les scapes dépassent l'occiput de près de la moitié de leur longueur. Second article du funicule long comme la moitié du premier, mais 1 1/2 fois plus long qu'épais. Thorax biéchancre. Le mésonotum est étranglé au milieu, comme chez les *Acantholepis*, formant au profil une selle ou échancrure médiane. Sa portion antérieure forme avec le pronotum la convexité ordinaire. Sa portion postérieure, vue de côté, est cunéiforme, presque aiguë et presque subbidentée au sommet, descendant en talus vers l'échancrure méso-métanotale qui est profonde. Le métanotum forme une bosse élevée et arrondie, avec une face basale ascendante et convexe et une face déclive presque plane. Écaille basse, subrectangulaire, inclinée en avant. Abdomen de la forme ordinaire chez le genre.

Métanotum et épistome subopaques, finement, mais distinctement ridés en travers. Le reste luisant et à peu près lisse, sauf l'abdomen qui est faiblement chagriné.

Quelques poils dressés assez raides et jaunâtres, sur la tête et l'abdomen. Le reste sans poils dressés, mais pourvu d'une pubescence très fine et espacée.

D'un brun châtain plus ou moins foncé. Tarses et articulations jaunâtres. Antennes d'un brun jaunâtre. Pattes brunâtres.

♀. — Long. 4,7 mill. — Tête à bord postérieur largement échancre, plus large que longue. Les scapes dépassent l'occiput de plus des 2/5 de leur longueur. Face déclive du métanotum bien plus longue que la face basale. Forme du corps ordinaire, sans rien qui rappelle la forme du thorax de l'ouvrière. Quelques poils dressés au thorax; pubescence assez forte, bien plus dense que chez l'ouvrière. Du reste comme cette dernière. Les ailes manquent.

Montagnes du Natal, récoltée par M. R. Wroughton. Une ouvrière de cette espèce se trouve dans la collection de fourmis récoltée dans le temps au Cap de Bonne-Espérance par M. Burchell.

FORMICA FUSCA, v. **rubescens** n. var. — Je donne ce nom à la