

FOURMIS D'ETHIOPIE

Récoltées par M. le baron Maurice de Rothschild en 1905

Décrites par A. FOREL

1^{re} Sous-famille. **PONERINAE** Lep.

G. Anochetus Mayr.

Anochetus Rothschildi n. sp.

♂ L. 7 à 7, 3 mill. Mandibules lisses, luisantes, longues comme les $\frac{2}{5}$ environ de la tête, avec un bord interne inerme, assez obtus, terminé par un angle obtus avant l'extrémité. Celle-ci est constituée par trois longues dents pointues, recourbées en dedans, et écartées, dont la médiane, plus courte, part de l'inférieure. Le bord externe des mandibules forme une arête assez vive, vers la base du moins. Epistome fortement échancré au milieu de son bord antérieur. Tête conformée comme chez l'*africanus* Mayr, mais plus allongée et plus retrécie derrière, avec les yeux bien plus grands et plus convexes, placés en dessus d'une cavité moins profonde des joues. Second article du funicule aussi long que le premier et que le troisième (bien plus court chez l'*africanus*). Articles 2 à 8 du funicule $\frac{2}{3}$ à 3 fois plus longs qu'épais (articles 2 à 4 moins de 2 fois plus longs qu'épais chez l'*africanus*). Les scapes un peu plus longs atteignent l'angle occipital. Thorax plus allongé que chez l'*africanus*, n'ayant qu'une échancrure très étroite à la suture méso-métanotale. La face basale du métanotum a un profil parfaitement rectiligne qui se continue sur le mésonotum (un peu convexe chez l'*africanus*). Elle se termine derrière par un angle obtus, mais très net, tuberculiforme. Face déclive abrupte longue comme les $\frac{2}{5}$ de la face basale. Ecaille très épaisse à la base, formant de profil un cône obtus au sommet, plus épaisse et plus