

basse que chez l'*africanus*, avec un bord supérieur transversal, entier et obtus. Sous le pédicule, un lobe translucide assez trapézoïdiforme. Abdomen très distinctement étranglé après son 1^{er} segment (bien plus que chez l'*africanus*), qui est plus allongé que chez l'*africanus*. Pattes plus grêles et plus longues que chez l'*africanus*.

Entièrement luisant et lisse, sauf quelques stries très faibles et longitudinales sur les arêtes frontales. Corps glabre, sauf quelques poils dressés jaunâtres sur l'abdomen et vers la bouche. Les pattes et les scapes n'ont qu'une pubescence jaunâtre, adjacente et fine.

D'un roux pâle, un peu brunâtre ou jaunâtre. Hanches, cuisses et tibias jaunâtres, sauf les articulations qui sont plus foncées, brunâtres.

♂ L. 6 mill. Mandibules rudimentaires, Bord antérieur de la tête droit ou légèrement concave. Les yeux très gros occupent tout le côté de la tête, sauf l'occiput qui est convexe, Scape deux fois plus long qu'épais. Premier article du funicule aussi épais que long ; le reste filiforme. Le métanotum a un bord tuberculiforme ; face déclive plus courte que la basale. Ecuille basse, épaisse à la base, largement échancrée au sommet, ce qui la rend obtusément bidentée. Un lobe triangulaire à pointe dirigée en avant sous le pédicule. L'hypopygium se termine par une longue pointe poilue, obtuse au bout. Des cerci. Valvules génitales extérieures courtes, convexes, très larges, épaisses.

Tête et thorax mats, finement réticulés. Abdomen luisant, lisse avec des points espacés. Pilosité dressée à peu près nulle ; pubescence adjacente très espacée, fine, jaunâtre, plus serrée sur les membres.

D'un jaune d'ocre clair, uniforme ; ailes légèrement teintées de brun, avec les nervures et la tache marginale brunes.

Région de Daouculé, Pays Somali ; Diré, Daoua, Abyssinie ; Haut Aouache, Eudessa, Ethiopie méridionale.

Le ♂ est un peu douteux, n'ayant pas été récolté avec les ♀. Néanmoins je ne crois pas faire erreur en le leur rapportant.

Cette espèce est voisine d'*africanus* et de *Traegaordhi* Mayr, mais plus allongée et bien distincte par les téguments absolument lisses de l'ouvrière. Le *Traegaordhi* a le métanotum strié, l'écaille plus mince, et le 2^e article du funicule bien plus court que le premier.