

D'un jaune brunâtre terne, varié d'ondes brunes. Tête d'un brun jaunâtre. Pattes et antennes d'un jaunâtre terne. Ailes teintées de jaune roussâtre avec les nervures et la tache marginale brunâtres.

Pheidole rotundata Forel subsp. **ilgii** Forel.

♀ 4 ♀ ♂.

Hiéka-Bourka, Karssa, Tchafanani, Kounhi (Ethiopie méridionale) ; Addis Abeba (Ethiopie) ; Harrar.

♀ Tête plus large que longue, plus large que chez la *rotundata* typique, plus excavée derrière, avec un espace lisse plus distinct pour les scapes. Les tibias n'ont que des poils obliques. Les ailes sont très grandes, longues d'au moins 10 mill. (8 mill. chez la *rotundata* typique dont le corps est aussi grand : 7,5 mill.

D'un brun très foncé, avec la moitié basale des funicules, les mandibules, les tarses et les articulations rougeâtres. Du reste comme le type de l'espèce.

♂ Les yeux sont plus petits et la tête est plus rétrécie derrière que chez la *rotundata* typique. Le scape est plus grêle et plus long, deux fois plus long que le premier article du funicule. Longueur du corps, 5,5 mill., d'une aile antérieure 7,2 mill. Chez la *rotundata* typique, le corps a 4,8 ou 5 mill., et l'aile antérieure en a 6.

Tête brunâtre ; thorax d'un brun jaunâtre ; le reste d'un jaune terne et clair. Chez la *rotundata* le thorax et la tête sont d'un jaune un peu roussâtre.

C. Cremastogaster Lund

Cremastogaster ferruginea Forel var. **aquila** n. var.

♀. Premier nœud à peine plus large que long (bien plus large chez le type et la var. *hararica*). Second nœud moins large aussi ; chacune de ses moitiés est plus longue que large (aussi large que longue chez le type et la var. *hararica*). La sculpture du thorax est plus grossière que chez le type de l'espèce et même que chez la var. *hararica*.

D'un brun à peine roussâtre. Devant de l'abdomen roussâtre. Plus foncé que la var. *hararica* et surtout que l'espèce typique, qui est plutôt jaune orangé que ferrugineux.