

minée par deux épines robustes, courtes, médiocrement pointues, subhorizontales, peu divergentes, légèrement incurvées en dedans; leur bord externe continue directement celui de la face basale; elles sont un peu plus longues que la largeur de leur base. Face déclive oblique, aussi longue que la basale. Premier nœud comme chez le *C. scutellaris* Ol., élargi devant, avec le bord antérieur droit et les angles antérieurs arrondis, sans dent dessous. Second nœud divisé en deux moitiés subcirculaires, séparées par un profond sillon; il est un peu moins large que le premier. Abdomen assez allongé.

Finement, mais fort distinctement réticulé, peu luisant. Thorax et pédicule subopaques. Epistome et joues finement et densément striés en long. Pronotum finement ridé transversalement. Pattes et scapes réticulés; face déclive du métanotum lisse. Une ponctuation espacée très effacée, plus distincte sur l'abdomen. Pilosité dressée nulle, sauf quelques poils sur le devant de la tête et sous l'abdomen. Une pubescence jaunâtre, adjacente, courte, régulièrement espacée, sur tout le corps et sur les membres.

D'un brun marron (membres inclus). Thorax et pédicule d'un brun un peu plus clair. Abdomen d'un roux jaunâtre. Mandibules et devant de la tête d'un brun plus rougeâtre.

Uomber (Ethiopie méridionale).

Cette espèce appartient au groupe *tricolor-Menileki*, mais ses courtes et robustes épines la distinguent des formes *Menileki* Forel, *Chiarinii* Emery et *ferruginea* Forel, auxquelles elle ressemble le plus. Le *Menileki* est en outre plus lisse et plus luisant, avec le premier nœud plus arrondi devant; il a le thorax moins échancré et n'a pas le pronotum ridé, mais c'est son plus proche parent. Le *Chiarinii* est plus robuste, plus grand, a le bord terminal des mandibules oblique et long, les scapes plus courts et une autre couleur. Le *ferruginea* (var. *hararica*) est aussi plus robuste et a le thorax tout autrement et plus fortement sculpté. Enfin le *C. Rothschildi* a des affinités avec le *C. Sewelli* Forel, subsp. *Marnoi* Mayr, par ses courtes épines. Mais le *Sewelli-Marnoi* n'a que de courtes dents obtuses; il est en outre plus petit, plus luisant, et a le 2° nœud moins divisé en deux, seulement sillonné au milieu.

Il faut reconnaître néanmoins que les *Cremastogaster* africains constituent un terrible dédale de formes variables. Il se peut fort bien qu'on doive tôt ou tard réunir divers groupes d'espèces en les ramenant à de simples sous-espèces d'un type commun.