

Camponotus rufoglaucus Jerdon subsp.
flavomarginatus Mayr.

♀ ♂ ♀. Confluent Akaki rive droite, Karssa, Mont Zyoual, Kounhi, Barko, Bourka E (Ethiopie méridionale); Harrar; Tchercher (Abyssinie méridionale).

Sous-espèce de l'Afrique orientale. L'espèce *rufoglaucus* occupe avec diverses sous-espèces toute l'Afrique, le bassin Méditerranéen, l'Asie mineure, la Perse et l'Inde.

Camponotus foraminosus Forel subsp. **latinotus** n. subsp.

♀. L. 5, 8 à 7, 7 mill. Extrêmement voisin de la subsp. *europubens* Forel, de Delagoa; même sculpture de la tête et du corps. Mais la face basale du métanotum est déprimée, presque subbordée, à peine 1 1/2 fois plus longue que large, donc beaucoup plus large. La toison dorée de l'abdomen est moins brillante, cachant mieux la sculpture, et sans interruption médiane longitudinale. Elle est d'un doré plus pâle que chez *chrysurus* et *chrysogaster*. Le devant de la tête est beaucoup moins poilu. Par contre les soies blanches, longues, raides et obtuses, dispersées sur le corps, sont plus abondantes, surtout chez la petite ♀. Ces soies le distinguent de la subsp. *chrysogaster* Em., auquel il ressemble aussi. La face basale de son métanotum le rapproche un peu du *C. chrysurus* Gerst., mais elle est moins bordée, moins déprimée, et ne forme aucune échancrure à la limite du mésonotum. Noir. Les antennes, les mandibules et parfois les tibias et les tarses sont rougeâtres, le reste des pattes brun,

Lac Rodolphe (Afrique orientale anglaise); Haut Auache-Endessa (Ethiopie méridionale). Une ♀ de chaque localité.

Les nombreuses sous-espèces du *C. foraminosus* sont répandues dans toute l'Afrique tropicale.
