

No. VI.—FOURMIS DES SEYCHELLES, AMIRANTES,
FARQUHAR ET CHAGOS.

Par Prof. A. FOREL.

(Communiqué par M. J. STANLEY GARDINER, M.A., F.L.S.)

Lu le 21 février, 1907.

LA faune de toutes ces îles est essentiellement malgache ou dérivée de la faune malgache, comme on va le voir. M. le Prof. Emery a décrit dans les *Annales de la société entomologique de France* (1894, p. 67) les fourmis récoltées par M. Alluaud aux Seychelles et moi-même dans les *Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft* (Bd. xxi. Heft i. 1897, p. 185) les fourmis récoltées par le Dr. Völtzkow aux îles Aldabra.

Voici la liste des espèces récoltées par M. Stanley Gardiner :—

1. *Leptogenys maxillosa*, Smith.

♂ ♂. Seychelles; Amirantes (Eagle); Coetivy. — Espèce malgache, les Comores, etc.

2. *Tetramorium guinense*, Fabr.

♂. Cargados. Espèce cosmopolite, transportée par les vaisseaux.

3. *Tetramorium simillimum*, Smith.

♂. Ile Darros, Amirantes. Espèce cosmopolite, transportée par les vaisseaux.

4. *Monomorium pharaonis*, L.

♂. Ile Cerf, Providence. Espèce cosmopolite, transportée par les vaisseaux.

5. *Pheidole megacephala*, Fabr.

♂ ♀ ♂ ♀. Coetivy; Amirantes; Farquhar; Ile Desroches. Espèce cosmopolite.

6. *Pheidole punctulata*, Mayr.

Coetivy; Amirantes; Ile Desroches; Farquhar. Espèce africaine et malgache.

7. *Pheidole punctulata*, Mayr, subsp. *picata*, Forel.

♀ ♂ ♀. Cargados (Siren Island). Race malgache.

8. *Pheidole flavens*, Roger., var. *farquharensis*, var. nov.

Une seule ♂ mêlée à des *Camponotus grandidieri*. Les scapes sont un peu plus courts, et atteignent à peine le bord occipital. Les épines métanotales sont grêles et pointues. Pilosité un peu plus courte et moins éfilée. Du reste je ne puis la distinguer