

du type de la *Ph. flavens*, n'ayant vu ni ♂, ni ♀, ni ♂. Est-ce un transport par les vaisseaux de la *Ph. flavens* d'Amérique centrale, espèce très variable et abondante? Il faut plus de matériel pour décider.

Ile Farquhar.

9. *Technomyrmex albipes*, Smith, subsp. *foreli*, Emery.

♀. Ile Farquhar. Sous-espèce malgache.

10. *Plagiolepis madecassa*, Forel.

♀. Ile Desroches. Espèce malgache.

11. *Plagiolepis alluaudi*, Emery.

♀. Ile Farquhar. Espèce des Seychelles retrouvée plus tard dans les serres chaudes de Berne, ou elle a été importée.

12. *Prenolepis bourbonica*, Forel.

♀ ♀. Cargados (Siren Island); Coetivy; Iles Chagos. Espèce de la Réunion.

13. *Prenolepis longicornis*, Latr.

♀. Coetivy. Espèce cosmopolite, transportée partout par les navires.

14. *Prenolepis bourbonica*, Forel, var. *farquharensis*, var. nov.

♀ l. 2-4 mm. Plus grêle que le type de l'espèce, scapes un peu plus longs, dépassant presque de moitié le bord occipital. Tête encore plus étroite, bien plus longue que large. D'un brun pâle jaunâtre. Du reste identique au type de l'espèce.

Ile Farquhar.

15. *Camponotus foraminosus*, Forel, var. *grandidieri*, Forel.

♀ ♀ ♂. Seychelles (Château Margot à 1600 pieds sur l'île de Mahé); Farquhar. Les exemplaires du Château Margot ont la tête un peu plus large derrière avec plus de fossettes sur l'occiput et sont légèrement plus élancés, montrant une légère tendance à passer à la subsp. *aldabrensis*, Forel, des Iles Aldabra. Sous-espèce malgache, Comores, Seychelles et de l'Afrique Orientale.

16. *Camponotus maculatus*, Fabr., subsp. *boivini*, Forel.

♀ ♂. ♀ l. 9.5-10 mm. L'écaille est plus épaisse et plus basse que chez *hovoïdes*, à bord supérieur subrectiligne. Le métanotum est aussi un peu subcubique, à face déclive subverticale, mais à courbe arrondie entre deux, du reste comme l'ouvrière. Les ailes manquent.

Iles Chagos dans des troncs de Cocos pourris; Mahé, Seychelles, à 1800 pieds. Sous-espèce malgache, trouvée jusqu'ici à Madagascar seulement.

17. *Camponotus maculatus*, Fabr., subsp. *fulvus*, Emery.

♀ ♀. Seychelles; Iles Chagos. Sous-espèce spéciale aux Iles Seychelles, etc., mais se rattachant au groupe *radamæ* et *hova* de Madagascar.