

Disons encore quelques mots de certaines espèces :—

Le *Camponotus maculatus-fulvus* est un dérivé du groupe malgache *radamæ-hora*, bien plus grêle que ces formes, et propre aux Seychelles et aux îles Chagos.

Le *Camponotus foraminosus-aldabrensis* est un dérivé spécial semble-t-il, aux Aldabra.

Le *Camponotus maculatus-boivini* est un forme malgache typique qui se retrouve sans changement aux Seychelles et aux Chagos, de même que diverses autres.

Le *Prenolepis bourbonica* est une forme de la Réunion, des Seychelles et des îles Chagos, qui a une race en Inde (*bengalensis*), mais la race hindoue se retrouve aussi aux Seychelles.

La répartition du *Camponotus foraminosus-grandidieri* est fort curieuse. Le *C. foraminosus*, Forel, constitue une groupe considérable de sous-espèces multiples *toutes exclusivement africaines* sauf *grandidieri* et *aldabrensis*. La forme la plus répandue est *grandidieri* qu'on trouve à Madagascar, à Nossi-bé, sur la côte occidentale de l'Afrique, aux Comores, aux Aldabra et aux Seychelles. Est-ce une espèce de souche malgache ancienne, importée en Afrique, et ayant variée dès lors sur le continent africain seulement et aux Aldabra ? Je ne le crois pas. Je crois que le *C. foraminosus* est de souche africaine et a envahi de là les îles susnommées. Je le crois, parce que la subsp. *grandidieri* ne se trouve guère au centre de Madagascar, n'a de connexion avec aucune autre espèce malgache, et n'habite guère que les côtes et les îles, puis parce qu'elle ne varie presque pas tandis que les races ou sous-espèces africaines sont connexes à d'autres groupes du continent et varient énormément. La subsp. *aldabrensis* me paraît être une forme dérivée locale du *grandidieri* (voir no. 15).

En récapitulant nous avons pour les divers groupes d'îles en question 8 espèces cosmopolites ; 8 espèces malgaches, et 8 formes locales qui ont toutes dans leur dérivation un caractère malgache ; trois formes locales (sous-espèces ou variétés) dérivées d'espèces Indo-Malaises ; une espèce océanienne ; une espèce américaine évidemment importée et ayant un peu varié (comme le *Brachymyrmex cordemoyi*, Forel, à la Réunion et aux Comores) ; puis deux formes communes aux archipels, mais, l'une au moins, décidément dérivée malgache. Enfin une espèce *Pheidole punctulata* et une sous-espèce *Camponotus grandidieri*, sont communes aux faunes africaine et malgache, probablement dérivées de la première.