

A. Neotropische und nearktische Formen.

Ectatomma ruidum ROGER, ♀. Sabanilla und Carthagena, Colombie (C. Gagzo); Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

Ectatomma opaciventre ROGER, ♀. Paraguay (Jerrmann).

Paraponera clavata, ♀♀. Yungas, Bolivien (Ch. Bock); Obidos, Amazonas (Fruhstorfer); Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

Neoponera villosa F. subsp. *curvinodis* FORL., ♀. Yungas, Bolivien (Ch. Bock); Rio de Janeiro (Gagzo).

Neoponera villosa F. s. str., ♀. Guatemala (Kraemer); aus Veracruz mit Orchideen eingeschleppt, Station für Pflanzenschutz (Dr. Brick).

Neoponera tarsata LATR., ♀. Obidos, Amazonas (Fruhstorfer).

Pachycondyla striata F., ♂. Sao Paulo, Estancia Meyrink (J. Metz).

Pachycondyla fuscoatra ROGER, ♀. Obidos, Amazonas (Fruhstorfer).

Dinoponera grandis GUÉRIN v. *lucida* EMERY, ♀. Espirito Santo (Fruhstorfer).

Dinoponera grandis GUÉRIN v. *australis* EMERY, ♀. Estancia Postillon, Paraguay (Des Arts).

Euponera (Pseudoponera) stigma F., ♀. St. Marc, Hayti (Keitel).

Odontomachus hastatus F., ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

Odontomachus haematodes L., ♀♀. Port au Prince, Hayti (Keitel); aus Manaus eingeschleppt.

Odontomachus haematodes L. v. *paucidens* EMERY, ♀. St. Marc et Cap Haytien, Hayti (C. Gagzo); Insel Mona, zwischen Hayti und Porto Rico (Ch. Bock).

Odontomachus haematodes L. subsp. *hirsutiunculus* SM., ♀. Panama (Huwald).

Odontomachus haematodes L. subsp. *erythrocephalus* EMERY, ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

Eciton coecum LTR., ♀♂. Guayaquil (F. v. Buchwald); Espirito Santo (Fruhstorfer); Jundlahy, Brasilien (Speyer).