

*Eciton (Acamatus) Jerrmanni* FOREL, ♂. Paraguay (Kapt. Jerrmann).

*Eciton Westwoodi* EMERY, ♂. Sao Paulo (J. Metz).

*Eciton praedator* SM., ♀. Santos, Brasilien (J. Metz).

*Eciton hamatum* F., ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

*Eciton Burchelli* WESTW., ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

*Eciton (Acamatus) laticapum* EMERY subsp. *hospes* EMERY, ♂. Estancia Meyrink, Sao Paulo (J. Metz).

*Eciton (Acamatus) Fonscolombi* WESTW., ♂. Santiago de Chile (Philippi). Wenn die Etikette richtig ist, ist der Fund eines *Eciton* in Chile recht interessant und mir neu.

*Eciton (Acamatus) Melshaemeri* HALD subsp. *Des Artsi* n. subsp., ♂. L. 8,7 mm. Kiefer kürzer und etwas dicker als beim Arttypus. Kopf hinten leicht konvex und nicht konkav. Sowohl die hinteren wie die vorderen Kopfecken sind viel weniger scharf und rechteckig, mehr gerundet und fliehend, obwohl die hinteren noch deutlich sind. Das Mesonotum überragt vorn das Pronotum etwas stärker. Die Basalfläche des Metanotums geht gerundeter in die abschüssige über. Stielchen viel schmaler, kaum breiter als lang, mit weniger scharfem Rand. Schienen an der Basis etwas verdünnter. Mesothorax in der Mitte etwas weniger verbreitet. Das ganze Tier etwas schwächer, graziler gebaut. Punktierung schärfer, am Hinterkopf scharf, viel reichlicher und gröber als beim Arttypus. Die anliegende Behaarung ist dagegen viel kürzer und feiner. Die Behaarung der Beine etwas abstehender.

Farbe gelbbraun, etwas dunkler als beim Arttypus; Kopf schwarzbraun. Flügel viel heller als beim Typus der Art und mit schärferen, dunkler gefärbten Rippen und Randmal. Ihr Farbenhauch ist jedoch (obwohl viel schwächer) von einer dunkleren Nuance (mehr schwarzbraun; beim Arttypus mehr gelbbraun).

Estancia Postillon, Puerto Max am Rio Paraguay, N. Paraguay (Louis Des Arts jun.). 9. März 1905.

Vielleicht ist es eine eigene Art. Doch wäre zu ihrer genaueren Feststellung mehr Material nötig.

*Atta fervens* SAY., ♀ ♂. Acajutla, Salvador (R. Paessler).

*Atta sexdens* L., ♀ ♂. Santos (Gagzo); Petropolis (Dr. Ohaus); Espirito Santo (Fruhstorfer).

*Atta (Acromyrmex) octospinosa* REICH, ♀. Guayaquil (F. Buchwald).

*Atta (Acromyrmex) coronata* F., ♀. Espirito Santo (Fruhstorfer).

*Atta (Acromyrmex) coronata* F. subsp. *homalops* EMERY. Espirito Santo (Fruhstorfer). Emery betrachtet seine *A. homalops* als Varietät meiner *muticinoda*. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, denn ich finde unter den Exemplaren Fruhstorfers alle Übergänge von *homalops* mit den flachen Augen zu *coronata* mit den konvexen Augen, während die stämmigere