

*Pseudomyrma sericata* GUÉRIN, ♀. Lebend aus Pernambuco mit Orchideen nach der Pflanzenschutzstation in Hamburg eingeschleppt (Dr. Brick).

*Pseudomyrma elongata* MAYR v. *cubaensis* FOREL. Cap Haytien, Hayti (C. Gagzo).

*Pseudomyrma Championii* FOREL subsp. *Haytiana* FOREL, Port au Prince, Hayti (Keitel).

*Pseudomyrma elegans* SMITH, ♀. Estancia Postillon, Puerto Max, Paraguay (Louis Des Arts).

*Pseudomyrma excavata* MAYR v. *flaviventris* EMERY, ♀. Sabanilla (C. Gagzo).

*Pseudomyrma acanthobia* EMERY var. ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).

*Pseudomyrma acanthobia* EMERY subsp. *delicatula* FOREL, ♀. Sabanilla (C. Gagzo). Ein größeres Material aus verschiedenen Teilen Südamerikas zeigt mir, daß meine *Ps. delicatula* nur eine Unterart der sehr variablen *acanthobia* EMERY ist.

*Pseudomyrma Belti* EMERY subsp. *fulvescens* EMERY, ♀ ♂. Tampico, Mexique (H. Jourdan) et Sabanilla (C. Gagzo). Die Exemplare aus Tampico sind sehr stämmig, dasjenige aus Sabanilla gehört einer grazileren Varietät an.

♂. L. 6,7 mm. Kopf länglich oval, hinten etwas schmaler als vorn, gegen den Hals zu allmählich verschmälert. Die Augen nehmen nicht die Hälfte der Kopfseiten ein. Schaft so lang wie das 2. Geißelglied. Clypeus mit einem Zahn in der Mitte des Vorderrandes. Mandibeln mit geradem Außenrand und undeutlich gezähneltem Endrand. Thorax etwas schmaler als der Kopf. Beide Knoten länger als breit, hinten breiter.

Fein punktiert, mäßig glänzend, fein pubeszent. Kopf und Thorax zerstreut, Schienen und Fühlerschaft nicht abstehend behaart. Braun; Kiefer, Fühler und Beine bräunlichgelb; Flügel bräunlich angeraucht.

*Pseudomyrma gracilis* F., ♀. Colon (C. Gagzo).

*Pseudomyrma gracilis* F. subsp. *mexicana* EMERY v. *guayaquilensis* n. var., ♀. L. 5—6 mm. Kleiner als *mexicana*. Dunkelbraun, Hinterleib, Stielchen und Beine heller braun; Fühler und Schienen braungelb. Kiefer, Vorderrand des Kopfes und Tarsen gelb (Kiefer hellgelb). Der vordere Stiel des 1. Knotens noch kürzer als bei *mexicana typica*, viel kürzer als der Knoten; letzterer etwas breiter. Kopf ziemlich glänzend, weniger scharf punktiert wie auch der übrige Körper. Pubeszenz etwas länger.

Guayaquil, Ecuador (F. v. Buchwald).

*Iridomyrmex iniquus* MAYR, ♀. Mit Orchideen aus Brasilien in die Pflanzenschutzstation zu Hamburg eingeschleppt (Dr. Brick).