

Glänzend, verworren und seicht genetzt, am Körper zerstreut, überall gelblich absteheud behaart, sehr zerstreut pubeszent. Schienen und Fühlerschaft nur anliegend behaart. Gelblichbraun; Kiefer, Fühler und Beine blaß schmutziggelb.

Mit Orchideen aus Porto Alegre, Brasilien, nach der Station für Pflanzenschutz in Hamburg eingeschleppt (Dr. Reh). — Durch die langen Fühler sehr leicht erkennbar.

*Prenolepis longicornis* LATR. v. *Hagemanni* FOREL, ♀. Port au Prince, Hayti (Keitel).

*Camponotus rufipes* F., ♀. Estancia Postillon, Puerto Max, Paraguay (Louis Des Arts).

*Camponotus rufipes* F. subsp. *Renggeri* EM., ♀ ♂. Yungas, Bolivien (Ch. Bock); Espirito Santo (Fruhstorfer).

*Camponotus distinguendus* SPINOLA, ♀. Concepción (Scheding) et Valparaiso (Paessler), Chile.

*Camponotus chilensis* SPINOLA, ♀. Concepción, Chile (Scheding).

*Camponotus chilensis* SPINOLA subsp. *ruficornis* EM. Termas de Chillan, 1800 m, Chile (Scheding).

*Camponotus cingulatus* MAYR, ♀ ♀ ♂. Santos, Brasilien (C. Gagzo).

*Camponotus abdominalis* F., ♀ ♀. Jundjahy, Brasilien (A. J. Speyer); Bahia (C. Gagzo); Espirito Santo (Fruhstorfer).

*Camponotus melanoticus* EMERY v. *substitutus* EMERY, ♀. Pernambuco (C. Gagzo).

*Camponotus melanoticus* EMERY v. *multipilis* n. var., ♀. L. 9—12 mm. Größer als die v. *colorata* FOREL. Der ganze Körper viel länger und reichlicher behaart als bei den anderen Varietäten. Die langen starken rötlichen Haare erinnern an *abdominalis*, aber die Beine und der Fühlerschaft haben nur die kurzen, fast anliegenden Haare des *melanoticus*, und die ganze Gestalt ist diejenige dieser Art. Farbe wie bei der var. *colorata* FOREL.

♀. L. 13—14 mm. Die langen Haare weniger auffallend als beim ♀. Farbe der var. *colorata* FOREL.

♂. L. 7,2 mm. Braun. Einzelne lange Haare, die den anderen Varietäten fehlen.

Estancia Postillon, Puerto Max, N. Paraguay (Louis Des Arts jun.).

*Camponotus pennsylvanicus* DE GEER, ♀ ♂. Oregon, Portland (L. Levison). In Nußbaumholz aus den U. S. lebend importiert (Jourdan).

*Camponotus blandus* SMITH, ♀. Sabanilla (C. Gagzo).

*Camponotus coruscus* SMITH, ♀. Sabanilla (C. Gagzo).

*Camponotus Leydigi* FOREL, ♀ major. Jundjahy, Brésil (J. W. Speyer).

*Camponotus canescens* MAYR, ♀. Pacuarito, Costa Rica (Will. Paap).