

*Camponotus maculatus* F. sens. str., ♀. Mit Mangrove aus Ostafrika nach Hamburg eingeschleppt (Dr. Brick).

*Camponotus maculatus* F. subsp. *aethiops* LTR., ♀. Capri (Schütt und Oberdörffer).

*Camponotus maculatus* F. subsp. *thoracicus* F., var. *oasium* FOREL, ♀♀. Biskra (Martens, Schütt).

*Camponotus maculatus* F. subsp. *barbaricus* EMERY, ♀. Hammam R'irha (Martens).

*Camponotus maculatus* F. subsp. *Martensi* n. subsp., ♀. L. 10,5—16 mm. Schlanker als *thoracicus*; mindestens so schlank, aber viel größer als *erigens* FOREL. Die Farben sind ziemlich genau so verteilt wie bei *xanthomelas* EMERY (*dichrous* FOREL partim), aber greller, das Gelbe hell wie bei *thoracicus* v. *oasium* und ebenso das Braunschwarze. Kiefer scharf, 7- bis 8zählig. Schienen prismatisch mit starken Stachelchen. Matt; Abdomen schimmernd. Schuppe schmal und hoch. Der 1. Hinterleibsring hat eine deutliche schwarzbraune Querbinde. Beine länger als bei *thoracicus*.

Biskra (Martens); großer und kleiner ♀. Der kleine ♀ ist auffallend lang; sein länglich rechteckiger Kopf ist hinten so breit als vorn. Es gibt wohl kleinere Individuen. Diese schöne Subspezies, obwohl ähnlich gefärbt wie *xanthomelas* und *thoracicus*, ist am nächsten mit *erigens* verwandt. Sie ist aber nicht nur größer und anders gefärbt, sondern hat einen verhältnismäßig viel größeren, breiteren Kopf (4,5 mm lang und 4 mm breit, bei *erigens* ♀ maxima 3,5 lang und 2,8 breit). Da ich die Nester des *erigens* selbst fand und ausgrub, weiß ich bestimmt, daß größere ♀ bei ihm nicht vorkommen. Ferner überragt der Fühlerschaft des großen ♀ den Hinterhaupttrand nur um etwas mehr als  $\frac{1}{4}$  seiner Länge, bei *erigens* aber um mehr als  $\frac{1}{2}$ . Endlich ist der Hinterleib bei *erigens* schärfer skulptiert, fast matt und die Schuppe dicker, niedriger, aber stumpf (bei *Martensi* ♀ major oben scharfrandig).

*Camponotus maculatus* F. subsp. *atramentarius* FOREL var. *liocenemis* EM. Mozambique (Zoologische Gesellschaft).

*Camponotus akwapimensis* MAYR, ♀ (♂?). Liberia (Kieselbach).

*Camponotus Meinerti* FOREL, ♀. Liberia (Kieselbach).

*Camponotus longipes* GERST., ♀. Barikiwa, Deutsch-Ostafrika (Ch. Schröder).

*Camponotus rufoglaucus* JERDON subsp. *vestitus* SM., ♀. Deutsch-Ostafrika (Kaiserl. Gouvernement).

*Polyrhachis schistacea* GERST., ♀. Barikiwa, Deutsch-Ostafrika (Ch. Schröder).

*Polyrhachis militaris* F., ♀. Barikiwa, Deutsch-Ostafrika (Ch. Schröder).