

FOURMIS DU MUSÉE DE BRUXELLES

FOURMIS DE BENGUELA

Récoltées par M. CREIGHTON-WELLMAN, et

FOURMIS DU CONGO

Récoltées par MM. LUJA, KOHL et LAURENT

Déterminées et décrites par A. Forel

I. — Afrique équatoriale et australe.

Paltothyreus tarsatus F. — ♂ et ♀. — Ile de Piscis (Guinée portugaise) (LUCAS); Lac Léopold II (LEYDER); Katanga (LEMAIRE); Haut Congo (DUCHESNE); Ikelemba (KINSBERGEN).

Streblognathus aethiopicus SM. — ♂. — Basutos (coll. TOSQUINET).

Plectroctena caffra KLUG. — ♂. — Katanga (LEMAIRE).

Euponera (Pseudoponera) Darwini FOREL, var. **africana** n. var. — ♀. — Tête presque aussi large que longue. Nœud du pédicule moins tronqué, plus arrondi devant, surtout à son bord antérieur supérieur qui est moins net et, vu de profil, ne forme pas un angle un peu acuminé comme chez le type de l'espèce, ni comme chez la var. *indica* EMERY. Du reste tout à fait semblable à la var. *indica* EM. et surtout à la var. *madecassa* EM., dont le nœud est déjà moins tronqué devant que chez le type et la var. *indica*, mais pas aussi arrondi que chez l'*africana*. — Luki (D^r A. JULLIEN), une seule ♀.

Leptogenys Stuhlmanni MAYR. — ♂. — Afrique Nord-Est (von ERLANGER).

Odontomachus haematodes L. — ♂, ♀. — Léopoldville (coll. LAMARCHE); Boma (LEBOUTTE).

Dorylus (Anomma) Wilwerthi EMERY. — ♂. — Léopoldville (coll. LAMARCHE); Iringui (LINDEMANS).

Un ♂ de Mobeka (LOTHAIRE), de 26 à 30 mill., est plus rougeâtre et plus large que celui du *nigricans*, et il a les mandibules un peu plus longues et plus étroites. Le vertex est aussi un peu plus bombé. C'est celui de l'*A. Wilwerthi*, car M. LUJA a trouvé le même en compagnie des ♂.

Dorylus (Anomma) nigricans ILLIG. — ♂. — Congo (DELEVAL);