

à 5 mill. — Mandibules lisses, ponctuées, avec quelques stries vers l'extrémité, paraissant armées de cinq dents (en partie cachées par l'épistome). Tête en trapèze arrondi, un peu plus longue que large, plus large derrière que devant, avec les côtés et surtout le bord postérieur convexes. Devant, elle est obtusément tronquée (subtronquée), comme chez le *C. truncatus* ♂, avec les angles antérieurs faisant saillie devant et la fossette clypéale profonde. Bord antérieur de l'épistome à peu près droit. La partie médiane de l'épistome est faiblement convexe avec les côtés convergeant faiblement en arrière et une carène médiane très faible et obtuse. Aire frontale petite, transversale. Arêtes frontales assez distantes, fort peu divergentes. La partie subtronquée de la tête atteint l'origine des antennes. Yeux grands, situés au tiers postérieur. Les scapes dépassent le bord postérieur de la tête de près du tiers de leur longueur. Thorax convexe, un peu cylindrique, comme chez le *C. clerodendri* Em., mais plus allongé, avec l'échancrure plus évasée et moins profonde. Épinothum comme chez le *C. Clerodendri*, mais la face déclive est plus concave (vue de profil), plus courte que la face basale. Ecaille cunéiforme, convexe devant, presque plane derrière, épaisse, à peu près comme chez *badius* Sm. et *Clerodendri* Em. Tibias sans piquants.

Médiocrement luisant et finement réticulé partout d'une façon égale. Pubescence d'un gris jaunâtre, plus longue que chez le *badius*, assez adondante partout, surtout sur le thorax et l'abdomen, où elle forme un léger duvet. Quelques poils dressés sur l'abdomen; presque point ailleurs. Les scapes et les pattes n'ont qu'une pilosité oblique, assez courte, subadjacente sur les scapes. Entièrement d'un rouge brunâtre plus terne et plus clair que chez le *badius*. Pattes et antennes à peine plus claires que le reste. Quelquefois des bandes transversales indistinctes un peu plus foncées sur les segments abdominaux.

2. — Long. 5,8 mill. — Mandibules armées de 6 dents, beaucoup plus épaisses que chez l'ouvrière, avec un bord externe en arête. Devant de la tête nettement tronqué jusqu'au quart postérieur de l'épistome. La partie médiane de ce dernier étroite, à côtés absolument parallèles, avec une carène distincte au milieu. La surface tronquée est à peine concave et n'est qu'obtusément bordée (très obtusément même derrière). La tête est subrectangulaire, à peine élargie derrière, à bord postérieur presque droit, à peine concave, dépassé par les scapes d'1/6 de leur longueur. Echancrure thoracique plus faible que chez l'ouvrière; les deux faces de l'épinothum d'égale longueur.

Quelques stries longitudinales superficielles sur les joues (côtés