

IV. — Amérique.

Paraponera clavata F. — ♂. — Cette espèce brésilienne porte avec d'autres la fausse étiquette « Guinée »!

Atta (Acromyrmex) Emilii FOREL, var. **Ajax** n. var. — ♂. — Long. 10,5 mill. — D'un brun foncé. Encore plus grand que le type de l'espèce. La paire postérieure des épines mésonotales très petite. Les épines sont en partie tuberculées; les épines occipitales portent même deux fortes dents secondaires vers leur base. Mandibules plus luisantes et bien plus faiblement striées que chez l'*Emilii* typique; tête un peu moins large. Les tubercules latéraux du dos du premier segment abdominal sont bien plus faibles, les épines postérieures supérieures du premier nœud par contre bien plus longues. Du reste comme le type de l'espèce.

Fausse étiquette : « Guinée ». C'est un insecte néotropical comme toutes les *Atta*, probablement du Brésil. L'*Emilii* typique, qui est le géant du sous-genre *Acromyrmex*, provient du bassin de l'Amazone.

V. — Contenu de l'estomac d'un Pangolin (*Manis Temminki*) du Bas Congo (Solon).

1. *Dorylus (Anomma) Emeryi* MAYR, subsp. **opaca**, n. subsp. — ♂. — Long. 2,8 à 8,5 mill. — (Les plus grands individus sont probablement défaut). Diffère comme suit du type de l'espèce typique en comparant des ♂ de taille égale ou correspondante :

Mandibules un peu plus étroites, avec la dent préapicale plus petite et plus près de l'apicale, tandis que la dent postérieure est au contraire plus forte. Tête relativement un peu plus allongée, moins retrécie derrière, et surtout avec les angles occipitaux beaucoup plus obtus, plus arrondis, et non recourbés en bas. Chez les grandes ♂ le bord antérieur de l'épistome est presque droit, tandis que chez l'*Emeryi* typique de même taille il est un peu avancé. Les funicules sont d'une idée plus courts et plus épais. Pas de sillon médian au vertex. L'échancrure de l'occiput est du reste aussi forte et les angles postérieurs sont prolongés (obtusément). Du reste même forme du reste du corps. Entièrement mate sur le corps, y compris l'abdomen; pattes et scapes subopaques, la sculpture étant plus profondément réticulée-ponctuée. L'*Emeryi* typique est subopaque et a les membres luisants. La pubescence est aussi plus distincte, un peu plus abondante et plus longue. Quelques poils dressés sur le dos de l'abdomen, du pédicule et de l'épinotum.

Cette sous-espèce paraît être en outre, plus petite que l'*Emeryi*