

La variété *esta* ♂ se distingue du type de l'espèce, de Kamerun, par sa tête moins large (plutôt un peu plus longue que large), à côtés moins convexes et par l'absence de carène médiane sur l'épistome, et, presque toujours aussi sur le pronotum. La couleur est plus terne, d'un jaune terne et sale, uniforme. Le promésotomum est un peu moins large et n'est pas subépaulé (angles antérieurs tout à fait effacés et arrondis). Du reste identique et longue de 2 à 2,5 mill.

♀ Long. 2,1 à 2,4 mill Mandibules comme chez l'ouvrière, mais plus étroites et avec six ou sept dents seulement, dont les deux antérieures seules sont bien distinctes et développées. Tête petite, rectangulaire-arrondie, à peine plus large derrière que devant, avec les côtés médiocrement convexes. Partie médiane de l'épistome plus aplatie encore que chez l'ouvrière, même un peu imprimée ou concave. Antennes comme chez l'ouvrière, mais les articles 2 à 8 du funicule encore plus transversaux, deux fois plus épais que longs. Yeux au milieu des côtés. Thorax plus étroit encore que la tête. L'épinotum forme une seule surface obliquement déclive, très faiblement convexe. Premier nœud peu distinct de son pétiole antérieur, bien plus néanmoins que chez le *globulinodis*, convexe en dessous, plus long que large. Second nœud deux fois plus large que le premier, un peu plus large que long.

Luisante. Tête ridée en long, en partie réticulée, ayant sur les côtés en partie des réticulations fines et ponctiformes comme chez

bien plus épais que longs. Arêtes frontales divergentes. Yeux situés un peu en arrière du milieu des côtés. Suture pro-mésotomale à peu près obsolète. Promésotomum aussi large que long, subépaulé, avec une petite carène médiane sur le pronotum. Une échancrure méso-épinotale distincte, assez étroite, peu profonde (fait défaut aux espèces de MAYR). Face basale de l'épinotum aussi haute que le mésotomum, plus longue que la face déclive. Pas trace de dents ni d'épines. Premier nœud avec un pétiole antérieur court, mais fort distinct (chez les deux autres espèces africaines nœud et pétiole sont confondus). Le nœud est cubique-arrondi, un peu plus large que long. Second nœud un peu plus large, mais à peine aussi haut que le premier et un peu plus large que long.

Densément réticulé-punctué et mat. Ponctuation éparse, piligère, peu distincte. Abdomen et membres lisses. Pédicule réticulé et subopaque, sauf le dos luisant du 2^m nœud. Front, joues et épistome en outre finement ridés longitudinalement ainsi que les côtés de la tête. Pilosité dressée très courte, jaune, très éparse sur la tête et l'abdomen, nulle ailleurs. Pattes et scapes avec une pubescence jaunâtre peu dense qui fait presque défaut ailleurs (plus visible sur l'abdomen).

D'un jaune un peu terne; tête et thorax d'un roux jaunâtre ou d'un jaune roussâtre.

Kamerun (CONRADT). Bien distinct des deux espèces africaines connues, tant par sa sculpture et la forme du 1^{er} nœud que par l'échancrure thoracique. Le *R. Wroughtoni* Forel de l'Inde (et ses races) a des épines à l'épinotum. C. EMERY.

(Mon ami EMERY m'excusera, mais je ne puis, malgré son désir, m'approprier une espèce préalablement reconnue et nommée par lui.)