

10. **Camponotus manidis** n. sp. — Long. 4 à 6 mill.

♂ *major*. Mandibules épaisses, peu luisantes, éparsément ponctuées, finement chagrinées, armées de 5 dents. Epistome biéchancré, à peine avancé au milieu, un peu déprimé devant, au milieu, subcaréné derrière (faiblement). Aire frontale très petite; arêtes frontales fortement divergentes, sinueuses. Tête en trapèze, à peine plus longue que large, élargie et largement échancrée derrière, à côtés assez convexes. Yeux en avant du tiers postérieur. Les scapes dépassent à peine le bord occipital (de moins de leur épaisseur). Articles du funicule un peu plus longs qu'épais. Thorax assez court, médiocrement convexe en tout sens, sans échancrure; néanmoins derrière la suture mésoépinotale, la face basale de l'épinotum se relève légèrement. Cette face basale est subdéprimée, subbordée, rectangulaire, $1 \frac{2}{3}$ fois plus longue que large, de même longueur que la face déclive, à laquelle elle passe par une courbe. Ecaille biconvexe, arrondie et tranchante à son bord supérieur, d'épaisseur moyenne. Pattes assez courtes; tibias cylindriques, sans piquants.

Luisant, très finement et faiblement chagriné. Ponctuation piligère éparsée très distincte, surtout sur le front où les points sont assez gros. Mais il n'y a aucune grosse fossette sur les joues, ni sur le devant de la tête, rien qui rappelle le *C. foraminosus* FOREL. Une pilosité dressée d'un jaune rougâtre, abondante ou du moins assez abondante sur tout le corps. Sur les tibias et les scapes, cette pilosité devient plus courte et oblique, mais elle y est abondante et fort apparente.

Brun ou d'un brun jaunâtre. Funicules, mandibules et pattes d'un rouge ou d'un jauné brunâtre (selon les exemplaires).

♂ *minor*. Tout à fait semblable à la grande ouvrière; 5 dents aux mandibules; épistome plus caréné derrière. La tête est tout aussi trapézoïdiforme, élargie derrière, seulement un peu plus longue que large, mais ses côtés sont moins convexes et son bord postérieur à peine concave, presque droit. Face basale de l'épinotum un peu plus étroite, deux fois plus longue que large; écaille plus convexe devant. Du reste absolument identique et de même couleur.

Le pangolin semble avoir mangé un nombre modéré d'ouvrières dans deux fourmilières différentes, dont l'une appartient à une variété plus foncée (brune à pattes rougeâtres) qui est en même temps un peu moins robuste.

Cette espèce est bien caractérisée par sa pilosité.

11) *Camponotus foraminosus* FOREL, subsp. *delagoensis* FOREL, var **sorta** n. var. — ♂. — Long. 5 à 9 mill. Un peu moins robuste que le *delagoensis*; côtés de la tête un peu moins convexes. Face basale de l'épinotum un peu plus convexe et plus courte, plus courte