

que la face déclive. Ecaille biconvexe aussi, mais moins épaisse, plus tranchante au bord supérieur. Du reste absolument la même forme.

Plus mat; sculpture foncière (réticulée ou chagrinée), plus dense et plus profonde; thorax presque mat; abdomen moins luisant. Les fossettes de la tête identiques, aussi fortes et aussi abondantes. Pilosité plus longue, plus blanche, plus sétiforme, tout à fait semblable à celle de l'*Olivieri* FOR. Pubescence grisâtre beaucoup plus abondante que chez le type du *delagoensis* et même plus abondante que chez l'*Olivieri*, formant un duvet grisâtre peu dense, mais très apparent, surtout sur le thorax et l'abdomen. Même couleur que le *delagoensis* typique.

Diffère de l'*Olivieri* par sa taille plus grande et surtout par sa tête beaucoup plus élargie derrière et rétrécie devant, ainsi que par son pronotum plus déprimé.

La petite ouvrière a la tête plus longue que large, convexe et peu élargie derrière, sans grosses fossettes, du reste comme la grande.

♀. — Long. 9 à 11 mill. — Ailes brunes. Thorax un peu moins large que la tête. Du reste mêmes caractères que la grande ouvrière, mais la tête est un peu moins large (un peu plus longue que large) et a les côtés moins convexes.

♂. — Long. 7 à 7,5 mill. — Tête plus longue que large. Plus grand que celui du *Grandidieri*. Ailes brunes. Mat, sauf l'abdomen. Du reste semblable à celui du *Grandidieri* FOREL.

Cette variété ressemble aussi un peu à la subsp. *Perrisi* FOREL, mais elle est bien plus petite et a bien moins de fossettes à la tête. Puis l'abdomen est luisant (mat chez les *Perrisi*). C'est peut être une nouvelle sous-espèce. Le Pangolin en a avalé un très grand nombre d'ouvrières, passablement de ♀ et quelques ♂.

Somme toute, notre Pangolin a diné de onze espèces différentes de Fourmis, dont six déjà connues, une nouvelle, une représentée par une sous-espèce et trois par des variétés nouvelles. Ajoutons que deux des espèces connues (*Polyrhachis concava* et *Plagiolepis tenella*) sont des raretés. Il a même poussé le bon goût jusqu'à ne manger que très peu de l'espèce la plus commune (*Pheidole punctulata*) et modérément de l'*Ecophylla* subsp. *longinoda* qui est commune aussi. Il s'est surtout bourré de *Cremastogaster impressa*. Sauf les *Ecophylla*, la plupart de ces Fourmis étaient encore en fort bon état, donc peu digérées.

Il faut avouer que ce curieux Mammifère à écailles est un myrmécologiste de premier ordre qui fait honte à bien des chasseurs de notre race et qui méprise le gibier commun. Nous le recommandons à toute l'attention des entomologistes, et, en lui dédiant une espèce nouvelle, nous n'avons fait que lui rendre les honneurs qui lui sont dus.