

VI. — Benguela.

(M. CREIGHTON WELLMAN)

Paltothyreus tarsatus F. — ♀ Prise isolée.

Platythyrea lamellosa ROG. subsp. *suturalis* n. subsp. — ♀. — Long. 12 mill. — Un peu plus étroite et plus allongée que la subsp. *longinoda* FOREL. Mandibules sans dents, sauf l'apicale. Tête carrée, presque aussi large que longue. L'épistome est délimité par une suture bien visible, quoique très faible. Le mésonotum est plat et enfoncé, comme chez l'espèce typique; les deux sutures sont distinctes (la mésoépinothale aussi distincte que la promésonothale, ce qui la distingue de l'espèce typique), mais nullement enfoncées comme chez la subsp. *longinoda* FOREL. L'épinothum n'a ni dents, ni élévations; sa face déclive n'est pas concave et n'est que subbordée, ce qui la distingue encore de *longinoda*. Par contre le nœud est au moins aussi allongé que chez la subsp. *longinoda* FOREL. Les yeux sont bien plus grands que chez cette sous espèce, allongés, un peu plus longs que la distance de leur bord antérieur à celui de la tête. Second segment de l'abdomen à peine plus large que le premier (bien plus large chez la *longinoda*). Les gros points enfoncés bien plus effacés et moins nombreux que chez la *longinoda*, très peu apparents.

Megaloponera fetens. F. — ♀. — MAYR a montré (1907) que la *M. crassicornis*, GERST n'est pas une espèce, mais ne représente que les ♀ minimaes de la *M. fetens*. Or EMERY avait appelé *M. Dohrni* une forme intermédiaire entre *fetens* et *crassicornis*, forme qui donc, selon MAYR, doit représenter les ♀ moyennes de la même espèce. M. CREIGHTON WELLMAN a récolté des exemplaires qui constituent tous les passages de la *Dohrni* à la *crassicornis*, ce qui vient confirmer l'opinion de MAYR.

M. CREIGHTON WELLMAN assure que cette espèce va en armées (Army Ant) nombreuses.

Cremastogaster Wellmani n. sp. — ♀. — Long. 3 à 4 mill. — Mandibules striées et ponctuées. Tête carrée, un peu plus longue que large, au moins aussi large devant que derrière, à côtés à peine convexes, fortement échantrée derrière. Les scapes atteignent le 5^{me} postérieur de la tête chez les grandes, le 6^{me} chez les petites ♀. Yeux plats, un peu anguleux, au milieu des côtés. Antennes de 11 articles; massue de trois. Articles 3 à 5 du funicule plus épais que longs. Le pronotum a une face antérieure déclive passant par une courbe assez brusque à sa face postérieure supérieure qui est bien plus courte, subhorizontale et subplane, et qui forme avec le