

mésnotum une seule et même surface à peu près plane, mais pas même subbordée. Suture promésnotale très distincte. Le mésnotum s'avance devant, surtout chez les grandes ♀, au milieu, en forme de bec ou de pointe obtuse un peu soulevée, mais dans son ensemble, et sans former de carène, ni d'éminence circonscrite; une faible impression transversale derrière cette portion antérieure relevée. Echancre mésoépinotale étroite, abrupte, profonde, un peu comme chez le *Goeldii* FOREL, mais en moins fort. Face basale de l'épinotum subplane, presque trois fois plus large que longue au milieu, élargie derrière, ne formant pas d'arête surplombante comme chez le *Goeldii*, simplement abruptement tronquée à l'échancre. L'épinotum a deux tubercules larges et obtus au lieu d'épines. Face déclive un peu plus longue que la basale. Premier nœud en trapèze peu marqué, un peu plus long que large, légèrement plus large devant que derrière, avec le bord antérieur un peu arqué (convexe devant), parfois un peu anguleux. Second nœud un peu plus large que long, de la largeur du premier, sans trace de sillon médian, mais échancre ou fortement imprimé derrière.

Lisse et très luisant. Abdomen en partie très faiblement chagriné. Epistome et joues en partie finement ridés et subopaques, avec quelques très fines réticulations. Pilosité dressée nulle. Une pubescence extrêmement fine, courte et diluée se trouve partout, plus abondante sur les tibias et les scapes.

D'un rouge un peu roussâtre; abdomen brun noirâtre; pattes et antennes brunes. Parfois le pédicule, le thorax et même la tête deviennent d'un rouge brun assez foncé.

Récolté sur les arbres.

Une ♀ de 7 à 7,5 mill., à tête subopaque, très finement striée et réticulée, et avec des tubercules plutôt dentiformes à l'épinotum, du reste fort semblable, me semble se rapporter à cette espèce, mais précisément l'épinotum me rend la chose douteuse.

Pheidole sculpturata MAYR., subsp. *Berthoudi* FOREL. — ♀. — Recherche les pucerons.

Pheidole punctulata MAYR. — ♀, ♂. — Est une peste partout.

Tapinoma (Ecphorella) Wellmani n. subg., n. sp. **Ecphorella** n. subg. Diffère de *Tapinoma* par son épistome entier, sa tête déprimée, ses antennes épaisses, et surtout par le pédicule qui a une écaille très inclinée en avant, mais distincte et fort épaisse, arrondie au sommet. Comme il n'y a qu'un individu, je n'ai pu disséquer le gésier. Ce sous-genre se rapproche du S. G. *Doleromyrma* FOREL, par l'existence d'une écaille, mais celle-ci est très mince chez *Doleromyrma*.