

T. (E.) Wellmani n. sp. — ♂. — Long. 1,8 mill. Mandibules courtes, robustes, lisses, ponctuées, armées d'environ 7 dents. Epistome assez déprimé, largement biéchancré ou bisinué, faiblement convexe au milieu de son bord antérieur, sans carène. Son tiers antérieur est triangulairement aplati. Toute la tête est déprimée, trapézoïdiforme, élargie et échancrée derrière, rétrécie devant, à côtés médiocrement convexes. Yeux moyens, situés au milieu des côtés. Le scape atteint le septième postérieur de la tête environ. Antennes de douze articles, épaisses; dernier article du funicule fort épais, à peine plus long qu'épais; tous les autres, sauf le premier, plus épais que longs, les moyens deux fois plus épais que longs. Thorax court et épais. Sutures du thorax distinctes. Promésotum médiocrement convexe, aussi large que long. Pronotum deux fois et demie plus large que long. Echancrure mésoépino-tale distincte, mais peu profonde, avec deux stigmates saillants sur le profil. Face basale de l'épino-tum peu convexe; subhorizontale, élargie derrière, un peu plus large que longue, formant de chaque côté, derrière, un angle arrondi ou tubercule très obtus. Face déclive subverticale, à peine plus courte que la face basale et passant à elle par une courbe. Écaille basse, fortement inclinée en avant, épaisse, obtuse et arrondie au sommet qui est aussi épais que la base. Pattes courtes; cuisses et tibias épais.

Lisse, luisante, avec des points piligères épars et fins et quelques vestiges de réticulations çà et là. Une fine pubescence jaunâtre assez diluée sur le corps, un peu plus abondante sur les membres qui n'ont pas de poils dressés. Quelques petits poils dressés sur l'abdomen.

D'un brun foncé. Pattes, antennes, mandibules et écaille d'un brun clair.

Une seule ♂. Ne sachant où placer cette petite fourmi, j'en fais provisoirement un sous-genre de *Tapinoma*, en attendant que le gésier soit connu. Je n'aurais pu le disséquer sans détruire l'abdomen du seul spécimen.

Camponotus Regina FOREL. — ♂.

Camponotus Caesar FOREL. — ♂ minor. — Forme typique. Mène une vie nocturne d'après M. WELLMAN.

Camponotus foraminosus FOREL, subsp. *auropubens* FOREL, var. **argentopubens** FOREL n. var. — ♀. — Long. 10,5 mill. — Tête comme chez l'*auropubens*, large et peu rétrécie devant, et même sculpture; mais la pubescence et la pilosité sont exactement celles du *Grandidieri* FOREL. Tête luisante derrière. Mésonotum luisant. Ailes enfumées de brun. Fossettes de l'*auropubens*.