

diluée, fine, roussâtre, plus abondante sur le devant de la tête. Les tibias et les scapes n'ont qu'une pilosité roussâtre oblique et courte, assez abondante.

D'un noir un peu brunâtre. Pattes et scapes d'un brun foncé. Mandibules et tarses d'un brun rougeâtre.

♂ major. Long. 18 mill. — Tête longue de 5 et large de 4,8 mill. comme chez la ♀, mais plus excavée derrière. Ecaille comme chez la petite ♀, mais plus haute et moins épaisse. Ponctuation fort espacée. Du reste comme la ♀ et la petite ♂.

♀. — Long. 24 mill. — Mandibules fortement ponctuées, armées de 8 dents, faiblement convexes sur tout leur bord externe. Lobe de l'épistome rectangulaire. Tête plus longue que large, en trapèze allongé, médiocrement élargie derrière et largement concave à son bord postérieur. Thorax un peu plus large que la tête. Ecaille haute, biconvexe, plus de deux fois plus haute que l'épaisseur de sa base. Tibias bien plus larges que chez la petite ♀, comprimés et cannelés, La ponctuation espacée qui fait presque défaut à la petite ♀ est assez abondante, fine, un peu effacée. Mandibules d'un brun foncé. Les ailes manquent. Du reste tous les caractères de la petite ♀.

La seule grande ♀ n'a pas été prise avec les ♀ minor et la ♀, mais provient de Kapema, Kipaila (Dr SHEFFIELD NEAVE) et se trouve au musée du Congo à Bruxelles. Le ♂ manque.

Cette belle espèce est parente du *C. Caesar* FOREL, mais bien distincte de lui par la forme de la tête. Les mandibules sont aussi plus larges, moins croisées et ont les dents plus courtes.

Polyrhachis Wellmani n. sp. — ♀. — Long. 8 à 8,5 mill. — Ressemble à s'y méprendre à la *P. schistacea*, GERST, typique, mais en diffère comme suit :

La tête a un bord postérieur légèrement plus marqué. L'épistome n'a pas de carène. Le thorax, surtout le pronotum, est plus étroit; les épines du pronotum sont plus rapprochées, moins divergentes et moins longues. L'écaille n'a que deux fortes épines plus divergentes que chez *schistacea* et légèrement courbées en arrière à ses angles supérieurs; pas trace d'épines latérales.

En outre, l'écaille est bien plus épaisse au sommet, c'est-à-dire plus convexe au haut de sa face antérieure, et les épines, au lieu d'être dirigées en haut, sont dirigées à la fois en haut et en arrière; pas trace non plus de dents entre les deux épines dont la disposition rapprochent cette espèce du groupe *armata*, *dives*, etc., lors même qu'elle appartient à tous les autres égards au groupe *relicens*. Les pattes et les antennes sont un peu plus courtes que chez la *schistacea*; les scapes ne dépassent le bord occipital que de leur moitié (chez la *schistacea* de près des 2/3). Enfin l'épistome est plus